Stomp® CS

Taimekaitsevahend
HERBITSIID

Stomp CS on süsteemse toimega mullaherbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks suviteraviljadel ristiku, lutserni, herne ja kõrreliste allakülviga, hernel, oal, kartulil, sibulal, porrul, küüslaugul, porgandil, juurpetersellil ja kapsal ning tulbil ja nartsissil.

Toimeaine: pendimetaliin 455 g/l
Preparaadi vorm: kapselsuspensioon (CS)

Toodet võivad osta ja kasutada ainult professionaalsed kasutajad.



UFI:VMX2-707P-7008-N34T

Hoiatus

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H361d Arvatavasti kahjustab loodet
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P202 Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist
P280 Kanda kaitsekindaid ja kaitserõivastust.
P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pekend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
P272 Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia.
P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Ohtlikud ained: pendimetaliin

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Tootjafirma telefon: +49 180 2273112
Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Pakend: 1 l, 5 l,10 l, 50 l
Eestis registreerimise number: 0427/04.01.12

Partii nr.:	vaata pakendil
Valmistamise kuupäev:	vaata pakendil
Säilivusaeg:	3 aastat valmistamise kuupäevast alates
Säilitamine:	Hoida temperatuuril 0 ^{o}C kuni + 40 ^{o}C.

Loa valdaja: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Leedu
Tootja/pakkija: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa
Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Tel.: 372 530 30755, e-post: agronoom@basf.com

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE ETIKETTI

Toote kirjeldus
Stomp CS formulatsiooniks on suspensioon mikrokapslites, sisaldades pendimetaliini 455 g/l. See on lahustivaba, vee baasil formulatsioon, mis tagab parema keskkonnaohutuse, määrib vähem, ei lõhna ja on kergem ning paindlikum käsitleda, segada ja puhastada. Pendimetaliin kuulub dinitroaniliinide keemilisse gruppi, liigitatuna HRAC Grupp K1.
Stomp CS on juurte kaudu taime tungiv mullaherbitsiid. Tärkamisjärgsel kasutamisel võib taime imenduda ka lehtede ja varte kaudu. Stomp CS jäägid on pikaajalise mõjuga, mis aitab hästi tõrjuda pritsimisjärgselt tärganud umbrohtusid. Stomp CS on tõhus kõrrelistele umbrohtudele nagu rukki–kastehein, aas–rebasesaba, murunurmikas, samuti kaheidulehelistele ja laialehelistele umbrohtudele – roomav madar e. virn, kõrvikud, iminõgesed, kummelid, vesihein, põldlõosilm, mailased, kannikesed jt. Stomp CS mõjub kõige paremini tärkamiseelselt kuni umbrohtude 2 lehe faasini, kuid on vähem tõhus hästi arenenud juurestikuga umbrohtudele ja ei tõrju juurest kasvavaid mitmeaastaseid umbrohtusid.

KULTUURID JA KULUNORMID
Suviteraviljad lutserni, ristiku, herne ja kõrreliste allakülvidega
Kulunorm: Stomp CS 0,9 l/ha + Basagran® 480 1,0 – 2,0 l/ha.
Töötlemise aeg: Pritsitakse tärkamiseelselt või kohe pärast tärkamist (BBCH 00-13, kuni 3. leheni).
Ooteaeg – 42 päeva
Maksimaalne töötlemiste arv – 1

Hernes (puhaskülv)
Kulunorm: Stomp CS 1,0 – 2.2 l/ha
Töötlemise aeg: Pritsitakse tärkamiseelselt või kohe pärast tärkamist (BBCH 00-13, kuni 3. leheni). Seemned peavad olema mullaga hästi kaetud, külvisügavus vähemalt 2 cm. Hea mullaniiskus suurendab umbrohutõrje efektiivsust.
Maksimaalne töötlemiste arv – 1

Uba
Kulunorm: Stomp CS 1,0 – 1,45 l/ha või Stomp CS 1,0 + Basagran 480 2,0 l/ha.
Töötlemise aeg: Pritsitakse tärkamiseelselt või kohe pärast tärkamist (BBCH 00-13, kuni 3. pärisleheni).
Oluline, et seemned oleksid mullaga hästi kaetud, külvisügavus vähemalt 2 cm. Pritsitakse vahetult pärast külvi. Hea mullaniiskus suurendab umbrohutõrje efektiivsust.
Maksimaalne töötlemiste arv – 1

Sibul, küüslauk
Kulunorm: Stomp CS 2,2 – 3,6 l/ha.
Stomp CS'i pritsitakse tärkamiseelselt.
Külvatud seemned peavad olema mullaga hästi kaetud, külvisügavus vähemalt 2 cm. Pärast külvi pritsida nii ruttu kui võimalik enne kultuuri ja umbrohtude tärkamist.
Mugulsibula istutamisel kasutada Stomp CS't isutamiseelselt. Jälgida, et pritsitud mulla pealiskiht ei puutuks kokku istutatud mugulate juurtega.
Hävitab hästi erilehist linnurohtu, põld-lõosilma, kannikesi, mailasi, harilikku hiirekõrva, iminõgeseid, hanemaltsasid, maltsasid, kõrvikuid, põld – litterheina jt. laialt levinud umbrohtusid.
Töötlemise aeg: Seemnete külvil: Stomp CS'i tuleb kasutada vahetult külvijärgselt – enne tärkamist, mullaniiskus on oluline. Mugulsibula istutamisel: Stomp CS't tuleb kasutada istutamiseelselt, mullaniiskus on oluline.
Maksimaalne töötlemiste arv – 1

Porru
Kulunorm: Stomp CS 2,2 – 3,6 l/ha.
Seemnest kasvatamisel pritsitakse pärast harimist tärkamiseelselt. Oluline, et seemned oleksid mullaga hästi kaetud, külvisügavus vähemalt 2 cm. Pärast külvi on soovitav külvipeenar rullida ja pritsida Stomp CS'ga nii ruttu kui võimalik kuni mulla pealiskiht on veel niiske.
Hävitab hästi erilehist linnurohtu, põld-lõosilma, kannikesi, mailasi, harilikku hiirekõrva, iminõgeseid, hanemaltsasid, maltsasid, kõrvikuid, põld-litterheina jt. laialt levinud umbrohtusid.
Töötlemise aeg: Pritsitakse vahetult pärast külvi – enne kultuuri ja umbrohtude tärkamist.
Maksimaalne töötlemiste arv – 1

Porgand
Kulunorm: Stomp CS 2,2 – 3,6 l/ha
Töötlemise aeg: Porgandit pritsitakse ainult tärkamiseelselt. Oluline, et seemned oleksid mullaga hästi kaetud, külvisügavus vähemalt 2 cm. Pärast külvi pritsida nii ruttu kui võimalik. Hea mullaniiskus suurendab umbrohutõrje efektiivsust.
Maksimaalne töötlemiste arv – 1

Kartul
Kulunorm: Stomp CS 2,2 – 2,90 l/ha
Stomp CS'i kasutatakse kartulil kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks tärkamiseelselt pärast viimast muldamist. Ei tohi kasutada hiljem kui 7 päeva enne tärkamist. Pärast herbitsiidi kasutamist ei tohi mulda harida.
Töötlemise aeg: Viimane ülesmuldamine kuni 7 päeva enne tärkamist. Tõrjeefekt on kõige suurem, kui umbrohud on väikesed ja muld niiske. Tõrjeefekti suurendamiseks enamikele umbrohtudele tuleks kasutada Stomp CS'i paagisegus Mistral®'iga 0,5 kg/ha.
Maksimaalne töötlemiste arv – 1

Juurpetersell
Kulunorm: Stomp CS 2,2 – 3,6 l/ha
Töötlemise aeg: Juurpeterselli pritsitakse ainult tärkamiseelselt. Oluline, et seemned oleksid mullaga hästi kaetud, külvisügavus vähemalt 2 cm. Pärast külvi pritsida nii ruttu kui võimalik. Hea mullaniiskus suurendab umbrohutõrje efektiivsust.
Maksimaalne töötlemiste arv – 1

Kapsas
Kulunorm: Stomp CS 2,2 – 3,6 l/ha
Töötlemise aeg: Pritsitakse pärast viimast harimist ja enne taimede istutamist. Jälgida, et pritsitud mulla pealiskiht ei puutuks kokku istutatud taimede juurtega. Mitte pritsida istutamisjärgselt kui prognoositakse tugevat vihmasadu. Mitte kasutada Stomp CS'i istutamisjärgselt, kuna kultuur võib kahjustuda.
Maksimaalne töötlemiste arv – 1

Tulp ja nartsiss
Kulunorm: **Stomp CS** 3,6 l/ha. ***Töötlemise aeg:*** Enne või kohe pärast tärkamist (BBCH 00-13).
Vee kogus
Kasutatava vee hulk 200 – 400 l/ha.
Vähendatud vee koguse soovitus
Stomp CS'i võib kasutada ka vee hulgaga 100 l/ha, kuigi tõrje efektiivsust sellise vähendatud kogusega ei ole põhjalikult uuritud. Seetõttu on pritsimine vee kogusega 100 l/ha kasutaja enda vastutusel.

Pritsimislahuse valmistamine
Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Lisa vajalik kogus Stomp CS'i ja ülejäänud vee kogus, jätkates pidevalt segamist. Stomp CS'i kokkusegamisel teiste pestitsiididega täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Lisa segupartner ja ülejäänud vee kogus, jätkates pidevalt segamist. Stomp CS lisa viimasena. Jätkake pidevalt segamist pritsimislahuse valmimiseni. Segage 15 minutit, enne kui alustate pritsimist pärast tööseisakut.

Segatavus teiste preparaatidega
Stomp CS't võib segada Basagran® 480.

Pritsi puhastamine
Pese prits hoolikalt puhta veega kohe pärast kasutamist ja järgi seadme tootjapoolseid juhiseid.

Säilitamine
Hoida kinnises originaalpakendis, kaitstult külma eest, temperatuuril 0°C kuni +40°C. Hoida eemal soojusallikast. Hoida otsese päikesevalguse eest. Kinnises originaalpakendis ja õigetes tingimustes säilib preparaat 3 aastat.

Jäätmete ja taara kahjutustamine
Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga kuni preparaat on täielikult läbi imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Isikukaitsevahendid
Hingamisteede kaitse: Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide või pikaajalise mõju vastu: Kombineeritud filter gaaside/orgaaniliste, anorgaaniliste, happeanorgaaniliste ja leelisühendite aurude püüdmiseks (nt. EN 14387 Tüüp ABEK).

Kätekaitse: Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks (Soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit): näiteks nitriilkummi (0.4 mm), kloropreenkummi (0.5 mm), butüülkummi (0.7 mm) ja muud.
Silmakaitse: Ohutusprillid, mille küljed on suletud (kaitseprillid) (nt. EN 166)
Kehakaitse: Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, nt. põll, kaitsesaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt EN 14605 pritsmete korral või EN ISO 13982 tolmu korral).

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed
Kasutusjuhendi väited isiklike kaitsevahendite kasutamise kohta kehtivad viljakaitseainete käsitsemisel lõppkasutaja pakendis. Soovitav on kanda kinniseid töörõivaid.
Säilitage töörõivaid eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.
Esmaabimeetmed
Esmaabimeetmete kirjeldus: Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui patsient võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses külili asendis (taastumisasend). Eemaldage saastunud rõivad koheselt.
Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.
Kokkupuutel nahaga: Peske koheselt põhjalikult seebi ja veega, pöörduge arsti poole.
Kokkupuutel silmadega: Kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt 15 minutit voolava vee all ja pöörduda seejärel silmaarsti poole.
Allaneelamisel: Loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole. Ärge kutsuge esile oksendamist hingamisohu tõttu.
Käitlemine: Kohelge vastavalt sümptomitele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.

Kasutaja risk
Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisjuhend ning soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.

® - BASF registreeritud kaubamärk