LALSTOP® G46 WG

BIOFUNGITSIID

LALSTOP G46 WG on mõeldud seemnete ja mulla kaudu levivate seenhaiguste tõrjeks erinevate põllukultuuride seemikutel, kõrvitsalistel, kurkidel, tomatil, paprikatel, baklažaanil, salatil ja dekoratiivtaimedel kasvuhoones ning maasikatel kasvuhoones, avamaal ja tunnelites kasutamiseks.

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: maasikas, vaarikas, põlduba, mustikas, aedmurakas, porgand, juurviljad, sibul- ja mugulköögiviljad, salatid ja lehtköögiviljad, tomat, kurk, kapsalised, paprikad, kõrvitsalised, seemikud, puude seemikud, dekoratiivtaimed, viliköögiviljad, baklažaan, maitsetaimed, sigur, õun ning golfi- ja spordiväljakute muru.
NB! Kuna toode on laiendatud kasutamiseks eelmainitud kultuuridele professionaalse kasutaja (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/200 artikkel 51) taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Toimeaine: *Clonostachys rosea* tüve J1446, 1×10^9 KMÜ/g (900 g/kg).
Reg. Number: 929/23.07.2025
Prepatiivne vorm: märguvad graanulid (WG).
Loa valdaja: Danstar Ferment AG, Poststrasse 30, 6300 Zug, Šveits.
Tootja: Danstar Ferment AG, Poststrasse 30, 6300 Zug, Šveits.
Pakendajad: 1) Lallemand Soluções Biológicas LTDA, Av. Julia Fernandes Caixeta, 555 - Cidade Nova, Patos de Minas, MG 38706-420, Brasiilia, 2) Lallemand Soluções Biológicas LTDA, Estrada Prof. Messias José Baptista, 2007, Itaperú, Caixa Postal 455, 13.432-700 - Piracicaba, Brasiilia, 3) Salutaguse Pärmitehas AS, Salutaguse 79745, Kohila Vald, Rapla maakond, Eesti,

Pakendid: 5 g, 10 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg
Partii nr: trükitud toote pakendile.
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

P280 Kanda kaitsekindaid ja kaitsemaski.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Toode sisaldab *Clonostachys rosea* tüve J1446 eoseid ja seeneniidistikku. Mikroorganismid võivad esile kutsuda ülitundlikkuse reaktsioone.

Lubatud professionaalseks kasutamiseks.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

ESMAABI
Üldine teave: Viia kannatanu ohutsoonist eemale. Asetada/transportida stabiilses külili asendis. Eemaldage otsekohe preparaadiga määrdunud rõivad ning kahjutustada ohutult.
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida kannatanu soojas ja lasta puhata. Kaebuste püsimisel pöörduda arsti poole.
Kokkupuutel nahaga: Pesta koheselt rohke vee ja seebiga, lõpuks loputada veega. Nahaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: Loputada avatud laugudega silmi koheselt rohke veega vähemalt 15 minutit. Esimese 5 minuti möödumisel eemaldada kontaktläätsed (kui on) ning jätkata loputamist. Silmaärrituse ja punetuse püsimise korral pöörduda silmaarsti poole.
Allaneelamisel: loputada suud veega, MITTE kutsuda esile oksendamist. Pöörduda kohe arsti või mürgistusteabekeskuse poole.
Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

LALSTOP G46 WG-d võib kasutada ka mahepõllumajanduslikus tootmises kooskõlas määrusega (EÜ) nr 834/2007.

KASUTUSJUHISED:

Kavandatav kasutus: Juurehaiguste *Pythium*, *Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium,* hahkhallituse *Botrytis cinerea* ja askohütoosi (*Didymella bryoniae*) põhjustatud seenhaiguste tõrjeks mitmesugustel põllukultuuridel kasvuhoonetes, tunnelites ja avamaal.

<u>Kasutusjuhised</u>:

Põllukultuur	Patogeen	Kasutusaeg	Kasutusmeetod ja -määr	Vee kogus	Max kasutuskordade arv kasvutsüklis	Kasutuskordade vaheline min intervall (päevades)
Seemikud (Viliköögiviljad[1], lehtköögiviljade ja salatite tõusmed[2], värsked maitsetaimed[3] ja lillkapsad *Brassica* sp.) (Kasvuhoone)	*Pythium Rhizoctonia*	Kasutamine enne külvi (BBCH 00).	**Kasvupinnasesse/kasvu substraati segamine:** 20–50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
		Kasutamine pärast tärkamist seemiku faasis (BBCH 09-13).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 0,5-1 g/m^2 kohta	Reguleeritav, nt 1–2 liitrit 0,05% lahust/ m^2	3	21
Kurk (Kasvuhoone)	Hahkhallitus *Botrytis*	Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).	**Lehtede pritsimine:** 0.01–0.1 g/m^2 kohta	0,05% lahus 20–200 l/m^2	4	21
Kõrvitsalised (Kurgid, melonid, kõrvitsad, muskaatkõrvits, suvikõrvits ja pudelkõrvitsad**)** (Kasvuhoone)	*Pythium*	Kasutamine enne külvi (BBCH 00).	**Kasvupinnasesse/kasvu substraati segamine:** 20–50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
		Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui	**Tilkkastmine või mulla kastmine:** 20–25 g 1000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 40–50 l/1000 taime kohta	4	21

		kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).				
	Askohütoos *Didymella*	Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).	**Lehtede pritsimine:** 0.01–0.1 g/m^2 kohta	0,05% lahus 20–200 l/m^2	4	21
Tomat (Kasvuhoone)	*Pythium*	Kasutamine enne külvi (BBCH 00).	**Kasvupinnasesse/kasvu substraati segamine:** 20–50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
		Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).	**Tilkkastmine või mulla kastmine:** 20–25 g /1000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 40–50 l/1000 taime kohta	4	21
	Hahkhallitus *Botrytis*	Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).	**Lehtede pritsimine:** 0.01–0.1 g/m^2 kohta	0,05% lahus 20–200 l/m^2	4	21
Paprikad (*Capsicum* sp.) (Kasvuhoone)	*Pythium, Phytophthora*	Kasutamine enne külvi (BBCH 00).	**Kasvupinnasesse/kasvu substraati segamine:** 20–50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
		Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).	**Tilkkastmine või mulla kastmine:** 20–25 g /1000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 40–50 l/1000 taime kohta	4	21
	Hahkhallitus *Botrytis*	Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).	**Lehtede pritsimine:** 0.01–0.1 g/m^2 kohta	0,05% lahus 20–200 l/m^2	4	21
Baklažaan (Kasvuhoone)	*Pythium*	Kasutamine enne külvi (BBCH 00).	**Kasvupinnasesse/kasvu substraati segamine:** 20–50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
		Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on	**Tilkkastmine või mulla kastmine:** 20–25 g /1000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 40–50 l/1000 taime kohta	4	21

		omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).				
Aedsalat (Kasvuhoone)	*Pythium Rhizoctonia*	Kasutamine enne külvi (BBCH 00).	**Kasvupinnasesse/kasvu substraati segamine:** 20–50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
		Kasutamine pärast tärkamist kuni teine pärisleht on lahti volditud (BBCH 09-12).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 0.5–1 g/m^2 kohta	Reguleeritav, nt 1–2 liitrit 0,05% lahust/ m^2	3	21
		Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui kolmas pärisleht on lahti volditud kuni koristavate vegetatiivsete osade arenguni, kui taimel on sordiomane lehemass saavutatud (BBCH 13-49).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 20-25 g / 1 000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 40–50 l/1000 taime kohta	3	21
		Kasutamine enne istutamist kui idulehed on täielikult lahti volditud; kasvukuhik või pärisleht on nähtavad kuni viies pärisleht on lahti volditud (BBCH 10-15).	**Ümberistutavate taimede sissekastmine:** 0,05% lahus	0,05% lahus	1	-
Dekoratiivtaimed (potitaimed, lõikelilled) (Kasvuhoone)	*Pythium Phytophthora*	Kasutamine enne külvi või potti istutamist (BBCH 00).	**Kasvupinnasesse/kasvu substraati segamine:** 20–50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
		Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui kolmas pärisleht on lahti volditud kuni täisõitsemiseni (BBCH 13-65).	**Mulla kastmine või tilkkastmine:** 20-25 g / 1 000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 20–75 l/1000 taime kohta	4	21
		Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui kolmas pärisleht on lahti volditud kuni täisõtsemiseni (BBCH 13-65).	**Pinnase töötlemine:** 20-50 g / 1 000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,5 l poti suurus 20–50 liitrit 0,05% lahust/1000 taime kohta	4	21
	Hahkhallitus *Botrytis*	Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui kolmas pärisleht on lahti volditud kuni v egetatiivorganid on saavutanud oma lõpliku suuruse (BBCH 15-89).	**Lehtede pritsimine:** 0.01–0.1 g/m^2	0,05% lahus 20–200 l/m^2 olenevalt põllukultuuri tihedusest	4	21
Dekoratiivtaimed (pistikud, taimesibulad) (Kasvuhoone)	*Pythium Phytophthora*	Enne istutamist (BBCH 10-15).	**Sissekastmine:** 0,05 % lahus	0,05 % lahus	1	-
	Hahkhallitus *Botrytis*	Kasutamine pärast istutamist kasvufaasis (BBCH 15-89).	**Lehtede pritsimine:** 0.01–0.1 g/m^2	0,05% lahus 20–200 l/m^2 olenevalt põllukultuuri tihedusest	4	21
Maasikas (Avamaa ja tunnel)	Hahkhallitus *Botrytis*	Kasutamine õitsemisel õiepungade arenemisel, kui esimestel õitel on kroonlehed välja kujunenud kuni viljade moodustumiseni kui seemned on sigimikul selgelt nähtavad (BBCH 59-73).	**Lehtede pritsimine:** 0,125-0,3 kg/ha	0,05% lahus max 1000 l/ha	4	6

Maasikas (Kasvuhoone)		Kasutamine õitsemise ajal kui esimene õis on avanenud kuni viljade moodustumiseni kui seemned on sigimikul selgelt nähtavad (BBCH 60-73).	**Lehtede pritsimine:** 0,01-0,1 g/m^2	0,05% lahus 20–200 l/m^2	2	21

Ooteaeg: 1 päev

Allmärkuse nr	Põllukultuuri kategooria	Põllukultuuri kategooriasse kuuluvad liigid, mis on seotud kavandatava kasutusega
1	**Viliköögiviljad**	Kõrvitsad, tomat, paprikad (*Capsicum* sp.)[2], avokaado ja baklažaan
2	**Lehtköögiviljade ja salatite tõusmed**	Aedsalat (rooma salat, leht- ja peasalat), seller, *Cichorium* sp. (endiiviasigur, salatsigur, sigur), spinat, põldkännak, sarepta kapsasrohi ja kress (söödav)
3	**Maitsetaimed**	Harilik kikkaputk, basiilik, loorber, köömen, seller, aed-harakputk, murulauk, koriander, till, apteegitill, harilik leeskputk, majoraan, münt, pune, petersell, rosmariin, salvei, aed-piparrohi, estragon ja tüümian

<u>Vesisuspensiooni valmistamine</u>: LALSTOP G46 WG biofungitsiidi kasutatakse vesisuspensioonina. Esmalt segage LALSTOP G46 WG väheses koguses külma veega (nt 100 grammi 5 liitri kohta). Jätke suspensioon 5–10 minutiks seisma. Segage korralikult, kuni suspensioon on homogeenne, ning seejärel lahjendage lõpliku kontsentratsioonini. LALSTOP G46 WG vesisuspensiooni kasutatakse pritsimise, sissekastmise, tilkkastmise või kasvusubstraati lisamise teel. Lisage LALSTOP G46 WG suspensiooni tilkkastmissüsteemi segamispaagi kaudu või eraldi pritsepumba kaudu. Ärge segage seda segamispaagis koos teiste pestitsiididega ega kontsentreeritud väetiselahustega.

LALSTOP G46 WG veesegu tuleb kasutamise ajal pidevalt segada. Töölahus tuleb ära kasutada koheselt.

Suspensiooni kontsentratsioon	Seguvahekord	
	LALSTOP G46 WG	**Vesi**
0,05%	100 g	200 liitrit

<u>Kasvuhoones kasvavate köögiviljade tõrje:</u>
Esimene töötlemine toimub kohe pärast istutamist. Töödelge kogu taime, eriti tomatite, kurkide ja paprikate vart ja varre alumist osa LALSTOP G46 WG veeseguga, kuni see on ühtlaselt niiske, kuid mitte tilkmärg. Pöörake erilist tähelepanu haavatud piirkondadele. Suurema haigussurve ja lehehaigustele vastuvõtlikkuse korral pritsitakse kogu saaki LALSTOP G46 WG veeseguga. Korda ravi iga 3 nädala järel. LALSTOP G46 WG kasutuskogused ja vee segu tarbimine on toodud kasutusjuhendi tabelis.

***<u>Botrytis</u>* <u>hahkhallituse tõrje seemikutel, dekoratiivtaimedel (potitaimed, lõikelilled, pistikud ja sibulad)(kasvuhoone)</u>:**
Pritsige taimi LALSTOP G46 WG veeseguga, kuni need on ühtlaselt niisked, kuid mitte tilkmärgad. Töödelge pistikuid juurdumise ajal ja tõusmeid tärkamise ajal. Vajadusel korratakse ravi iga 3 nädala järel. Pistikuid ja seemikuid võib enne istutamist kasta ka 0,05% veesegusse. Soovitatav on töödelda üksnes rohttaimede pistikuid. Mitte kasutada juurdumata puitunud pistokstel (sissekastmise teel).

***<u>Botrytis</u>* <u>hahkhallituse tõrje maasikal (kasvuhoone):</u>** Maasikasaaki pritsitakse õitsemisfaasis kaks korda LALSTOP G46 WG-ga, mis on segatud 200–2000 liitri veega, koguses 0,01– 0,1 g/m² pritsimise kohta. LALSTOP G46 WG-d saab kasutada ka maasika hallhallituse integreeritud tõrjeks. Sellisel juhul asendage 1 või 2 keemilist pritsimist LALSTOP G46 WG töötlusega.

***Botrytis* hahkhallituse tõrje maasikal (avamaa ja tunnel):** Maasikakultuure pritsitakse LALSTOP G46 WG-ga, mis on segatud max 1000 liitri veega, kulunormiga 0,125–0,3 kg/ha ühe kasutuskorra kohta. Pihustusprotseduurid viiakse läbi max 4 korda õitsemise ajal, umbes iga 6 päeva järel, kasvufaasides BBCH 59-73, st õitsemise alguses, keskel ja lõpus. LALSTOP G46 WG-d saab kasutada maasika hahkhallituse integreeritud tõrjeprogrammis. Sellisel juhul asendatakse 1 või 2 keemilist pritsimist LALSTOP G46 WG töötlusega.

Juurehaiguste tõrje: Kasutage kasvusubstraadil külvamise, ümberistutamise ja/või istutamise ajal. Korrake tõrjet iga 3 kuni 6 nädala tagant. LALSTOP G46 WG 0,05% vesisuspensiooni kantakse peale pritsimise, sissekastmise, tilkkastmissüsteemi või kasvusubstraati segamise teel.

Soovitatavad annused: Kasutage viliköögiviljade ja dekoratiivtaimede puhul 1000 taime kohta 20–25 g LALSTOP G46 WG. Kui lisate LALSTOP G46 WG kasvusubstraati, kasutage kasvusubstraadi 1 m^3 kohta 20–50 g LALSTOP G46 WG. Esmalt segage graanulid veega, et tagada toote ühtlane jaotumine substraadis. Väikeste tõusmete (sh köögiviljad, värsked maitsetaimed ja dekoratiivtaimed) pritsimiseks/sissekastmiseks kasutage 1 m^2 kohta 0,5–1 g LALSTOP G46 WG (vee kogus määratakse substraadi niiskusesisalduse alusel). Üksikutel juurepallidel ja potitaimedel kasutamiseks pritsige/kastke kasvusubstraati nt LALSTOP G46 WG 0,05% vesisuspensiooniga, valides annuse juurepalli või poti suuruse alusel, nagu on näidatud järgmises tabelis:

Poti või juurepalli maht (poti läbimõõt)	LALSTOP G46 WG 0,05% suspensioon 1000 taime kohta	LALSTOP G46 WG kogus (g) 1000 taime kohta
100 ml (6 cm)	4–10 liitrit	2–5 g
250 ml (9 cm)	10–25 liitrit	5–12,5 g
500 ml (11 cm)	20–50 liitrit	10–25 g
1 l (14 cm)	40–100 liitrit	20–50 g

LALSTOP G46 WG KASUTAMINE VÄHELEVINUD VÕI VÄIKESE KASVUPINNAGA KULTUURIDEL (ARTIKKEL 51)

Kasutamine LALSTOP G46 WG allpool loetletud vähelevinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel omal vastutusel, arvestades toote tõhusust ja sihtkultuuride võimalikke kahjulikke mõjusid või kahjustusi. LALSTOP G46 WG kasutamisel vähelevinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel tuleb arvestada ka muude selles märgistuses esitatud sätetega.

LALSTOP G46 WG heakskiidetud kasutamine vähelevinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel (artikkel 51): seenhaiguste tõrjeks mitmesugustel põllukultuuridel kasvuhoonetes, tunnelites ja avamaal kooskõlas kasutusjuhiste järgmise tabeliga.

Põllukultuur	**Patogeen**	**Kasutusaeg**	**Kasutusmeetod ja -määr**	**Vee kogus**	**Max kasutuskordade arv kasvutsüklis**	**Kasutuskordade vaheline min intervall (päevades)**
Seemikud (viliköögiviljad[1], lehtköögiviljad ja salatid[2], sibul- ja varsköögiviljad[4], *Brassica* sp., maitsetaimed[3] ja dekoratiivtaimed) (Kasvuhoone)	*Fusarium* *Phytophthora* *Rhizoctonia* *Pythium** *ainult sibul- ja varsköögiviljadel, Brassica sp., värsked maitsetaimed ja ilutaimed	Enne külvamist (BBCH 00).	**Kasvupinnasesse/kasvusubstraati segamine:** 20–50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
		Kasutamine pärast tärkamist seemiku faasis (BBCH 09-12).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 0.5–1 g/m^2 kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 1–2 l/m^2	3	21
		Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui kolmas pärisleht on lahti volditud kuni	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 20 - 50 g/1000 taime kohta.	1600-2000 l/ha	4	21

		koristavate vegetatiivsete osade arenguni, kui taimel on sordiomane lehemass saavutatud (BBCH 13-49).	*_Pythium_ 20-25 g/1000 taime kohta			
	Hahkhallitus (*Botrytis)*	Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).	**Lehtede pritsimine:** 0,01 – 0,1 g/m^2	0,05% lahus 20–200 l/m^2	4	21
Viliköögiviljad (Kõrvitsad, tomat, paprikad ja baklažaan) (Kasvuhoone)	*Fusarium Rhizoctonia*	Kasutamine pärast lehtede 5 päris lehe paari lahti rullumist kuni vegetatiivorganid on täielikult välja arenenud (BBCH 15-89).	**Mulla kastmine / tilkkastmine:** 20–25 g 1000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 40–50 l/1000 taime kohta	4	21
		Enne külvamist (BBCH 00).	**Kasvupinnasesse/kasvusubstraati segamine:** 20 g/m^3 - 50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
	Phytophthora	Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).	**Mulla kastmine / tilkkastmine:** 20–25 g 1000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 40–50 l/1000 taime kohta	4	21
		Enne külvamist (BBCH 00).	**Kasvupinnasesse/kasvusubstraati segamine:** 20 g/m^3 - 50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
	Askohütoos (*Didymella)*	Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).	**Lehtede pritsimine:** 0.01 g/m^2 - 0.1 g/m^2	0,05% lahus 20–200 l/m^2	4	21
Kõrvitsad (kurgid, melonid, kõrvits, muskaatkõrvits, suvikõrvits ja suureviljaline kõrvits), **baklažaan** (Kasvuhoone)	Hahkhallitus (*Botrytis)*	Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).	**Lehtede pritsimine:** 0.01 g/m^2 - 0.1 g/m^2	0,05% lahus 20–200 l/m^2	4	21
	Phytophthora	Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).	**Mulla kastmine / tilkkastmine:** 20–25 g 1000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 40–50 l/1000 taime kohta	4	21

		Enne külvamist (BBCH 00).	**Kasvupinnasesse/kasvusubstraati segamine:** 20 g/m^3 - 50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
Kõrvitsad (kurgid, melonid, kõrvits, muskaatkõrvits, suvikõrvits ja pudelkõrvits), **baklažaan** (Avamaal ja tunnelis)	Hahkhallitus (*Botrytis)* Askohütoos (*Didymella)*	Esimene kasutamine kui varrele on ilmunud 2 pärislehte (BBCH 12) kuni varrele on ilmunud 5 pärislehte (BBCH 15). Teine kasutamine alates sellest kui varrele on ilmunud 9 või rohkem pärislehte (BBCH 19) kuni on moodustunud kaks külgharu (BBCH 22).	**Lehtede pritsimine:** 0.2 – 0.3 kg/ha.	300-800 l/ha 0,05 % lahus	2	21-28
Paprikad, baklažaan (Kasvuhoone)	Askohütoos (*Didymella)*	Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).	**Lehtede pritsimine**: 0.01 g/m^2 - 0.1 g/m^2	0,05% lahus 20–200 l/m^2	4	21
Avamaakurk (Avamaa ja tunnel)	Hahkhallitus (*Botrytis)* Askohütoos (*Didymella)*	Kasutamine alates kolme pärislehe faasist (BBCH 13) kuni viie pärislehe faasini (BBCH 15).	**Lehtede pritsimine:** 0.05 % lahus	300-800 l/ha	1	-
	Hahkhallitus (*Botrytis)* Askohütoos (*Didymella)*	Kasutamine alates sellest kui varrele on ilmunud 9 või rohkem pärislehte (BBCH 19) kuni on moodustunud kaks külgharu (BBCH 22).	**Lehtede pritsimine**: 0.2 kg/ha - 0.3 kg/ha	300-800 l/ha 0,05 % lahus	2	21-28
Lehtköögiviljad ja salatid (Kasvuhoone)	*Fusarium, Phytophthora Pythium* Rhizoctonia** *välja arvatud aedsalatil kasvuhoones	Enne istutamist (BBCH 00).	**Kasvupinnasesse/kasvusubstraati segamine:** 20 g/m^3 - 50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
		Kasutamine pärast tärkamist kuni teine pärisleht on lahti volditud (BBCH 09-12).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 0.5 g/m^2 - 1 g/m^2	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 1–2 l/m^2	3	21
		Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui kolmas pärisleht on lahti volditud kuni koristavate vegetatiivsete osade arenguni, kui taimel on sordiomane lehemass saavutatud (BBCH 13-49).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 20 - 25 g /1000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 40–50 l/1000 taime kohta	3	21
		Juurdunud pistikute, ümberistutatavate taimede ja taimesibulate sissekastmine enne istutamist kui idulehed on täielikult lahti volditud; kasvukuhik või pärisleht on nähtavad kuni viies pärisleht on lahti volditud (BBCH 10-15).	**Juurdunud pistikute ja ümberistutatavate taimede sissekastmine** 0.05 % lahus	0,05% lahus	1	-

Lehtköögiviljad ja salatid (Kasvuhoone)	Hahkhallitus (*Botrytis)*	Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).	**Lehtede pritsimine:** 0.01 g/m^2 - 0.1 g/m^2	0,05% lahus 20–200 l/m^2	4	21
Lehtköögiviljad ja salatid (Avamaa)	Hahkhallitus (Botrytis)	Kasutamine kui kolm pärislehe paari või männast on lahti rullunud alates (BBCH 13) kuni saagiks kasutatavad vegetatiivorganid on saavutanud 50% lõplikust suurusest (BBCH 45).	**Lehtede pritsimine:** 0.3 kg/ha - 0.4 kg/ha	0,05 % lahus 300 - 800 l/ha	2	21-28
Maitsetaimed, *Brassica* sp. (Kasvuhoone)	*Fusarium Pythium Phytophthora Rhizoctonia*	Enne külvamist (BBCH 00).	**Kasvupinnasesse/kasvusubstraati segamine:** 20 g/m^3 - 50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
		Kasutamine pärast tärkamist kuni teine pärisleht on lahti volditud (BBCH 09-12).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 0.5 g/m^2 - 1 g/m^2	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 1–2 l/m^2	3	21
		Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui kolmas pärisleht on lahti volditud kuni koristavate vegetatiivsete osade arenguni, kui taimel on sordiomane lehemass saavutatud (BBCH 13-49).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 20 - 25 g /1000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 40–50 l/1000 taime kohta	4	21
	Hahkhallitus (*Botrytis)*	Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).	**Lehtede pritsimine:** 0.01 g/m^2 - 0.1 g/m^2	0,05% lahus 20–200 l/m^2	4	21
Dekoratiivtaimed (potitaimed, lõikelilled, pistikud ja sibulad) (Kasvuhoone)	*Fusarium Rhizoctonia*	Enne külvamist või potti istutamist (BBCH 00).	**Kasvupinnasesse/kasvusubstraati segamine:** 20 g/m^3 - 50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
		Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui kolmas pärisleht on lahti volditud kuni täisõitsemiseni (BBCH 13-65).	**Mulla kastmine või tilkkastmine:** 20–25 g 1000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 20–75 l/1000 taime kohta	4	21
		Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui kolmas pärisleht on lahti volditud kuni täisõitsemiseni (BBCH 13-65).	**Pinnase töötlemine:** 20 g/1000 - 50 g/1000 taime kohta	Reguleeritav, nt 1 L poti suurus 10–100 liitrit 0,05% lahust/1000 taime kohta	4	21
		Juurdunud pistikute ja sibulate kastmine sissekastmine enne istutamist (BBCH 10-15).	**Taimede või sibulate sissekastmine:** 0,05% lahus	0,05 % lahus	1	-

Maasikas (Avamaa ja tunnel)	*Phytophthora* *Pythium* *Rhizoctonia*	Istutamisel (BBCH 00).	**Sissekastmine:** 0,05% lahus	0,05 % lahus	1	-
		Esimene kasutamine istutamisel. Teine kasutamine 3-4 nädalat peale istutamist, risoomi ladvapungast on eraldunud õisiku algmed, eristatavad on tihedalt kokkusurutud õiepungad (BBCH 55) kuni õisik on omandanud ma tüüpilise kuju, nupud longus, kroonlehed suletud (BBCH 57).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 20 – 25 g / 1000 taime kohta	600 – 1000 l/ha	2	21-28
Maasikas (Kasvuhoone)	*Phytophthora* *Fusarium* *Pythium*	Kasutamine kuni lehestiku arenguni, kui sisesoomused avatud, lehealged eralduvad (BBCH 10).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine** 0.3 kg/ha	600 l/ha	1	-
		Istutamisel kuni lehestiku arenguni, kui sisesoomused avatud, lehealged eralduvad (BBCH 10).	**Sissekastmine:** 0,05% lahus	0,05% lahus	1	-
		Esimene kasutamine kohe peale lehestiku arengu algust, kui lehealged eralduvad (BBCH 10). Teine kasutamine 4 nädalat peale istutamist, kui on õitsemine alganud ja 10% õitest on avanenud (BBCH 61).	**Mulla kastmine või tilkkastmine:** 0.5 kg/ha - 0.6 kg/ha	800-1000 l/ha	2	28
Maasikas ja vaarikas (Kasvuhoone)	*Rhizoctonia*	Enne külvamist (BBCH 00).	**Kasvupinnasesse/kasvusubstraati segamine:** 20 g/m^3 - 50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
		Kasutamine alates puhkemisest kuni teise lehe avanemiseni (BBCH 09-12).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 0.5 g/m^2 - 1 g/m^2	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 1–2 l/m^2	3	21
		Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui kolmas pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni saagiks kasutatavad vegetatiivorganid on saavutanud liigile omase täissuuruse (BBCH 13-49).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 20 – 25 g / 1000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 40–50 l/1000 taime kohta	3	21
Vaarikas (Kasvuhoone)	*Phytophthora* *Fusarium* *Pythium*	Enne istutamist (BBCH 00).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine** 0.125 kg/ha	250 l/ha	1	-
		Enne istutamist (BBCH 00).	**Sissekastmine:** 0,05% lahus	0,05% lahus	1	-
		Esimene kasutamine peale istutamist BBCH 00) kuni vars või lehekodarik on 10% oma lõplikust	**Mulla kastmine või tilkkastmine:** 0.25 kg/ha - 0.3 kg/ha	800-1000 l/ha	2	28

		pikkusest, jämedusest või läbimõõdust (BBCH 31).				
Vaarikas ja aedmurakas (Avamaa ja tunnel)	*Phytophthora Fusarium Rhizoctonia*	Istutamisel (BBCH 00).	**Sissekastmine:** 0,05% lahus	0,05 % lahus	1	-
	Hahkhallitus (*Botrytis) *avamaa*	Kasutamine alates õitsemise algusest (BBCH 60) kuni täisküpsuseni, kui viljad on täielikult liigile või sordile omase värvuse saavutanud (BBCH 89).	**Lehtede pritsimine:** 0.3 kg/ha - 0.4 kg/ha	300 - 800 l/ha 0,05 % lahus	3	7
	Phytophthora Pythium Rhizoctonia	Kasutamine avamaal ja tunnelis. Esimene kasutamine istutamisel (BBCH 00). Teine kasutamine 3-4 nädalat peale istutamist, kui vars või lehekodarik on 10% oma lõplikust pikkusest, jämedusest või läbimõõdust (BBCH 31) kuni vars või lehekodarik on saavutanud täispikkuse, -jämeduse või-läbimõõdu (BBCH 39).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 25 – 30 g/ 1000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 25–10 l/1000 taime kohta	2	21-28
	Hahkhallitus (*Botrytis) *tunnel*	Kasutamine alates õitsemise algusest (BBCH 60) kuni täisküpsuseni, kui viljad on täielikult liigile või sordile omase värvuse saavutanud (BBCH 89).	**Lehtede pritsimine:** 0.2 kg/ha - 0.3 kg/ha	0,05 % lahus 300 - 800 l/ha	3	7
Vaarikas (Kasvuhoone)	Hahkhallitus (*Botrytis)*	Kasutamine alates viienda pärislehe paarist kuni täisküpsuseni, kui viljad on täielikult liigile või sordile omase värvuse saavutanud (BBCH 15-89).	**Lehtede pritsimine:** 0.01 g/m^2 - 0.1 g/m^2	0,05% lahus 20–200 l/m^2	4	21
Mustikas (Avamaa ja tunnel)	*Phytophthora Pythium Rhizoctonia*	Istutamisel (BBCH 00).	**Sissekastmine:** 0,05% lahus	0,05% lahus	1	-
		Esimene kasutamine peale istutamist (BBCH 00). Teine kasutamine 3-4 nädalat peale istutamist, kui vars või lehekodarik on 10% oma lõplikust pikkusest, jämedusest või läbimõõdust (BBCH 31) kuni vars või lehekodarik on saavutanud täispikkuse, -jämeduse või-läbimõõdu (BBCH 39).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 25 – 40 g / 1000 taime kohta	250 – 1000 l/ha (0,05% lahus 70–300 l/1000 taime kohta)	2	21-28
	Hahkhallitus (*Botrytis)*	Kasutamine alates õitsemise algusest (BBCH 60) kuni täisküpsuseni, kui viljad on täielikult liigile või soridile	**Lehtede pritsimine:** 0.3 kg/ha - 0.4 kg/ha	0,05 % lahus 300 - 800 l/ha	3	7

		omase värvuse saavutanud (BBCH 89).				
Sõstrad (Avamaa)	Hahkhallitus (*Botrytis)*	Kasutamine alates õitsemise algusest (BBCH 60) kuni täisõitsemiseni (BBCH 65).	**Lehtede pritsimine:** 0.3 kg/ha - 0.4 kg/ha	0,05 % lahus 300 - 800 l/ha	3	7
Jõhvikas (Avamaa)	*Phytophthora Pythium Rhizoctonia*	Istutamisel (BBCH 00).	**Sissekastmine:** 0,05% lahus	0,05% lahus	1	-
		Esimene kasutamine istutamisel BBCH 00. Teine kasutamine 3-4 nädalat peale istutamist, kui vars või lehekodarik on 10% oma lõplikust pikkusest, jämedusest või läbimõõdust (BBCH 31) kuni vars või lehekodarik on saavutanud täispikkuse, -jämeduse või-läbimõõdu (BBCH 39).	**Mulla kastmine või pinnase töötlemine:** 0.3 kg/ha - 0.4 kg/ha	0,05 % lahus 250 – 1000 l/ha	2	21-28
Kapsalised (Avamaa)	Ristõieliste nuuter *Plasmodiophora brassicae*	Enne istutamist. Kasutamine alates kolme pärislehe paari lahti rullumisest (BBCH 13) kuni viie pärislehe paari lahti rullumiseni (BBCH 15).	**Pinnase töötlemine:** 5 kg/ha - 10 kg/ha	0,05 % lahus 250 – 1000 l/ha	1	-
		Kasutamine alates üheksa või rohkem pärislehtede paari või männast on lahti rullunud (BBCH 19) kuni on moodustunud kaks külgharu (BBCH 22).	**Pinnase töötlemine:** 0.3 kg/ha - 0.4 kg/ha	0,05 % lahus 250 – 1000 l/ha	2	21-28
Kapsalised (Kasvuhoone)	*Fusarium Pythium Phytophthora Rhizoctonia*	Kasutamine alates puhkemisest kuni teise lehe avanemiseni (BBCH 09-12).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 0.5 – 1 g / m^2	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 1–2 l/m^2	3	21
		Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui kolmas pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni saagiks kasutatavad vegetatiivorganid on saavutanud liigile omase täissuuruse (BBCH 13-49).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 25 – 25 g / 1000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 40–50 l/1000 taime kohta	4	21
	Hahkhallitus (*Botrytis)*	Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).	**Lehtede pritsimine:** 0.01 g/m^2 - 0.1 g/m^2	0,05% lahus 20–200 l/m^2	4	21
Sibulad (Kasvuhoone*, avamaa ja tunnel)	*Fusarium* Hahkhallitus (*Botrytis)*	Kasutamine istutamisel (BBCH 00) *avamaa või kui kolm pärislehe paari või männast on lahti rullunud kuni viis pärislehe paari või	**Sissekastmine:** 0,05% lahus	0,05% lahus	1	-

		männast on lahti rullunud. (BBCH 13-15) *tunneli kasutus puudub.				
		Kasutamine 21-42 päeva peale sissekastmist. Kasutamine alates üheksa või rohkem pärislehtede paari või männast on lahti rullunud (BBCH 19) kuni on moodustunud kaks külgharu (BBCH 22). *Kasvuhoones alates koristavate vegetatiivsete taimeosade arenemisest (BBCH 41) kuni sibul on saavutanud 50% oma lõplikust läbimõõdust (BBCH 45).	**Mulla (rea) kastmine või pinnase töötlemine:** Tunnelis ja kasvuhoones: 0.2 kg/ha - 0.3 kg/ha Avamaal: 0.3 kg/ha - 0.4 kg/ha	0,05 % lahus 250 – 1000 l/ha	1 *Kasvuhoone 2	- *Kasvuhoones 21-42
Sibul- ja varsköögiviljad (välja arvatud *Allium*) (Kasvuhoone)	*Fusarium* Hahkhallitus (*Botrytis)*	Istutamisel (BBCH 00).	**Sissekastmine:** 0,05% lahus	0,05% lahus	1	-
		Pärast istutamist alates lehtede arengust, kui viies pärisleht varrel on täielikult lahti volditud kuni täisküpsuseni, kui kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse (BBCH 15-89).	**Lehtede pritsimine:** 0.01 g/m^2 - 0.1 g/m^2	0,05% lahus 20–200 l/m^2	4	21
Sibul- ja varsköögiviljad (Kasvuhoone)	*Pythium Phytophthora Rhizoctonia*	Kasutamine enne külvi (BBCH 00).	**Kasvupinnasesse/kasvusubstraati segamine:** 20 g/m^3 - 50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
		Kasutamine alates kui vars, võrse või lehed tungivad maapinnale (BBCH 09) kuni kaks pärislehe paari või männast on lahti rullunud (BBCH 12).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 0.5 g/m^2 - 1 g/m^2	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 1–2 l/m^2	3	21
		Kasutamine pärast istutamist alates lehtede arengust, kui kolmas pärisleht on lahti volditud kuni koristavate vegetatiivsete osade arenguni, kui taimel on sordiomane lehemass saavutatud (BBCH 13-49).	**Mulla kastmine/pinnase töötlemine või tilkkastmine:** 20 – 25 g / 1000 taime kohta	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 40–50 l/1000 taime kohta	3	21
		Enne istutamist. Juurdunud pistikute, ümberistutatavate taimede ja taimesibulate sissekastmine enne istutamist kui idulehed on täielikult lahti volditud; kasvukuhik või pärisleht on nähtavad kuni viies pärisleht on lahti volditud (BBCH 10-15).	**Sissekastmine:** 0,05% lahus	0,05% lahus	1	-
Sigur (st salatsigur) (Kasvuhoone)	*Berkeleyomyces basicola*	Kasutamine peale saagikoristust enne juurte hoiustamist.	**Mulla kastmine / juurte sissekastmine:** 0,4 g/l	-	1	-

		Kasutamine peale saagikoristust enne juurte sund võrsetamist.	**Juurte pritsimine:** 0,2–0,4 g lahus	-	1	-
Porgand ja muud juurviljad (Avamaa)	*Fusarium, Rhizoctonia*	Kasutamine alates külvamisest (BBCH 00) kuni üheksa või rohkem pärislehtede paari või männast on lahti rullunud (BBCH 19).	**Pinnase töötlemine** 0.3 kg/ha - 0.4 kg/ha	0,05 % lahus 250 – 1000 l/ha	2	21-28
Põlduba (Avamaa ja tunnel)	Hahkhallitus (*Botrytis)*	Kasutamine kui kolm pärislehe paari või männast on lahti rullunud alates (BBCH 13) kuni saagiks kasutatavad vegetatiivorganid on saavutanud 50% lõplikust suurusest (BBCH 45).	**Lehtede pritsimine:** 0.3 kg/ha - 0.4 kg/ha	0,05% lahus 300–800 l/ha	2	21-28
Puude seemikud, sh okas- ja lehtpuud (Kasvuhoone, avamaa ja tunnel)	*Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium*	Enne külvamist (BBCH 00) *Avamaa ja tunnel või tärkamisel.	**Kasvupinnasesse/ kasvusubstraati segamine:** 20 g/m^3 - 50 g/m^3	Reguleeritav, nt 10–30 liitrit/m^3	1	-
		Kasutamine alates lehtede arengust (BBCH 10) kuni vars või lehekodarik on saavutanud täispikkuse, -jämeduse, -läbimõõdu (BBCH 39). *Kasvuhoones alates lehtede arengust, kuiesimesed lehed on eristunud (BBCH 10) kuni rohkem kui 5 pärislehe paari on lahti rullunud (BBCH 15).	**Mulla kastmine või pinnase töötlemine** 5 kg/ha – 10 kg/ha	Reguleeritav, nt 0,05% lahus 100–200 l / 100 m^2	5	28-42
	Hahkhallitus (*Botrytis)*	Kasutamine alatest lehtede arengust (BBCH 10) kuni vars või võrs on saavutanud täispikkuse, -jämeduse või -läbimõõdu (BBCH 39).	**Lehtede pritsimine:** 0.3 kg/ha - 0.5 kg/ha Kasvuhoones 0.2 kg/ha - 0.5 kg/ha	0,05% lahus 400–1000 l/ha	5	21-28
Golfi- ja spordimuru (Avamaa)	*Fusarium Rhizoctonia Pythium*	1-2 kasutust kevadel, 1-3 kasutust sügisel. Kasutamine alates kui esimene pärisleht ilmub koleoptiilist (BBCH 10) kuni külgharude ja võrsete moodustumise lõpuni (BBCH 29).	**Pritsimine:** 0.1 kg/ha - 0.2 kg/ha	300–400 l/ha	5	21-28
Õun (Avamaa)	*Neonectria*	Esimene kasutamine sügisel kui 50% lehtedest on kaotanud värvi või varisenud kuni puhkeolekuni (BBCH 95-99). Teine kasutamine kevadel peale puhkeperioodi algust kuni lehetipp on 1 mm üle soomuste (BBCH 00-09).	**Lehtede pritsimine:** 0,05% lahus	0,05% lahus 200–2000 l/ha	2	21-28

Allmärkuse nr	**Põllukultuuri kategooria**	**Põllukultuuri kategooriasse kuuluvad liigid, mis on seotud kavandatava kasutusega**
1	**Viliköögiviljad**	Kõrvitsad, tomat, paprikad (*Capsicum* sp.)[2], avokaado ja baklažaan

2	**Lehtköögiviljad ja salatid**	Aedsalat (rooma salat, leht- ja peasalat), seller, *Cichorium* sp. (endiiviasigur, salatsigur, sigur), spinat, põldkännak, sarepta kapsasrohi ja kress (söödav)
3	**Maitsetaimed**	Harilik kikkaputk, basiilik, loorber, köömen, seller, aed-harakputk, murulauk, koriander, till, apteegitill, harilik leeskputk, majoraan, münt, pune, petersell, rosmariin, salvei, aed-piparrohi, estragon ja tüümian
4	**Muud köögiviljad (sibul- ja varsköögiviljad)**	*Allium* sp. (sibul, porrulauk, küüslauk, murulauk), spargel, artišokk, apteegitill, hispaania artišokk ja *Apium* sp. (varsseller, juurseller)

MÄRKUSED:
LALSTOP G46 WG biofungitsiidi kasutatakse ennetavalt. LALSTOP G46 WG tuleb enne kasutamist segada või loksutada. Eeldada võib kasutusjuhendis nimetatud seenhaiguste madalat kuni mõõdukat tõrjet. Toode sobib kasutamiseks integreeritud kahjuritõrjes. Bioloogilise tõrjega kokkusobivuse kohta andmed puuduvad. Selle kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust registreerimistunnistuse omanikuga Lallemand Plant Care / Danstar Ferment AG. Toode ei ole kasulikele organismidele kahjulik. Ärge segage LALSTOP G46 WG segamispaagis koos keemiliste pestitsiididega ega kontsentreeritud väetiselahustega.

KASUTUSPIIRANGUD:
Mitte kasutada puitunud vartega juurdumata pistikute kastmistöötluseks. Mitte kasutada söödavatel põllukultuuridel hiljem kui 1 päev enne saagikoristust.

RESISTENTSUS
Toimeaine *Clonostachys rosea* tüvi J1446 kuulub FRAC rühma B02 mikrobioloogiliste toimeainete hulka. Resistentsuse riski hinnatakse madalaks, kuid toote kasutamisel peab järgima integreeritud taimekaitse põhimõtteid.

HOIUSTAMINE
Hoidke toodet jahedas, kuivas, hästi tuulutatavas ruumis, tootja originaalpakendis. Hoidke eraldi toiduainetest, veest, ravimitest ja loomasöödast. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Tavaline pakend (mitte vaakumpakend): säilimisaeg 18 kuud alates tootmise kuupäevast, kui toodet ladustatakse temperatuuril +4°C ning 12 kuud, kui toodet ladustatakse temperatuuril +25°C. Vaakumpakend: säilimisaeg 18 kuud alates tootmise kuupäevast, kui toodet ladustatakse temperatuurivahemikus +4°C kuni +25°C. Avatud pakendis on toote säilimisaeg 1 kuu, kui toodet ladustatakse temperatuuril +4°C.
Taara korduvkasutamine on keelatud. Tühjad pakendid tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.