SYLLIT® 544 SC

Fungitsiid

Kasutatakse õunviljaliste (õun, pirn) kärntõve ja kirsi-lehevarisemistõve tõrjeks.
Kasutamiseks ainult põllumajandusliku fungitsiidina.

Toimeaine**:** dodiin 544 g/l
Preparaatiivne vorm: suspensioonikontsentraat(SC)
Toote registreerimisnumber: 0535/21.11.14

Toodet tohib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toode sisaldab ohtlikku ainet dodiin.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhiseid.
Enne kasutamist lugeda läbi kõik ohutusjuhised ja suunised.



ETTEVAATUST

<u>Ohulaused</u>
H302 - Allaneelamisel kahjulik
H315 - Põhjustab nahaärritust
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi
H332 - Sissehingamisel kahjulik
H410 - Vägamürgineveeorganismidele, pikaajalinetoime

<u>Hoiatuslaused</u>
P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas
P261 - Vältida pihustatud aine sissehingamist
P270 - Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada
P280 - Kanda kaitseprille, kaitsekindaid
P301+P312 - ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
P302+P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga
P304+P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata
P305+P351+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.Loputada veel kord
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga
P332+P313 - NAHAÄRRITUSE KORRAL: pöörduda arsti poole
P391 - Mahavoolanud aine kokku koguda
P501 - Sisu/mahutikõrvaldadavastavaltkohalikeleeeskirjadele

EUH401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit

SP1 - Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide)
SPe3 - Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 20 m pinnaveekogudest

Muu teave

Tühja pakendit uuesti mitte kasutada.

Mitte pritsida õuna- ja pirnipuid hiljem, kui 60 päeva enne saagikoristust ja kirsse mitte hiljem, kui 14 päeva enne saagikoristust.

Kasutusjuhendis märgitud koguseid mitte ületada.

OHUTUSNÕUDED

Esmaabi

Kokkupuutel naha ja silmadega pesta koheselt rohke veega.Eemaldada saastunud riided.Õnnetuse korral pöörduda koheselt arsti poole. Võimalusel näidata toote etiketti või pakendit.

Isikukaitsemeetmed

Nii segamise/laadimise kui ka pritsimise ajal kasutada kindaid. Silma sattumisel loputada rohke veega. Nahale sattumisel loputada veega. Kaitse tõhustamiseks on soovitav kasutada kaitseülikonda, -saapaid ja -prille eriti just segamise/laadimise ajal.

Keskkonnakaitsemeetmed

Veevarude kaitsmiseks

Vältida vesikeskkonna reostamist toote või selle pakenditega. Mitte puhastada pinnavee läheduses / vältida aedade ja teede reostumist. Syllit 544 SC on väga mürgine vetikatele, kaladele ja teistele veeorganismidele.

Meetmed riskide leevendamiseks:

SPe3:Veeorganismide kaitseks pidada kinni mittepritsitavast puhvertsoonist 20 m pinnaveekogu veepiirist.

Mesilased ja kasulikud lülijalgsed
Syllit 544 SC pole ohtlik mesilastele ja kasulikele lülijalgsetele ning on seega tõhus vahend integreeritud kahjuritõrje programmis.

Netokaal: 1l, 5 liitrit

Loa haldaja:
Arysta LifeScience Benelux SRL
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougree
Belgia

Hoida külmumise eest

Partii nr: Vaata pakendilt
Tootmiskuupäev: Vaata pakendilt
Säilimisaeg: 2 aastat tootmiskuupäevast alates

Tootja/pakendaja:
Arysta LifeScience Benelux SRL.
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougree
Belgia

KASUTUSJUHISED

OLULINE:Käesolev informatsioon on kinnitatud etiketi osana ja seda tuleb lugeda enne toote kasutamist.

Kasutatakse õunviljaliste (õun, pirn) kärntõve ja kirsi-lehevarisemistõve tõrjeks.

Syllit 544 SCon vedela koostisega, mis sisaldab hästituntud toimeainet dodiini. Toode pakub nii ennetavat kaitset, kui ka ravitoimet infektsiooni algfaasis.

Kasutamine
Syllit 544 SC on heakskiidetud õunapuude kärntõve (*Venturiaineaqualis*), pirnipuude kärntõve (*Venturia pirina*) ja kirsi-lehevarisemistõve (*Blumeriellajaapii* = *Coccomyceshiemalis*) vastaseks kasutamiseks. Kõik muud kasutusvaldkonnad ei ole heakskiidetud. Pritsimisaja ja annuste väljaselgitamiseks juhinduda alltoodud tabelist.

Kultuur	Haigustekitajad	Maksimaalne kulunorm	Pritsimisaeg	Märkused
Õun Pirn	*Venturia inaequalis*: Õunapuude kärntõbi *Venturia pirina*: Pirnipuude kärntõbi	Üks pritsimine: 1,25 l/ha Kulunorm aasta kohta: 2,5 l/ha/aastas	Kasvufaasid 01 – 89	Maksimaalselt 2 pritsimiskorda kasvuperioodi jooksul intervalliga 7-10 päeva. Mitte kasutada hiljem, kui 60 päeva enne saagikoristust.
Kirss	*Blumeriella jaapii*: Lehevarisemistõbi	Üks pritsimine: 1,25 l/ha Kulunorm aasta kohta: 2,5 l/ha/aastas	Kasvufaasid 60-79 (õitsemisest kuni on moodustunud viljad) ja/või peale saagi koristust	Maksimaalselt 2 pritsimiskorda kasvuperioodi jooksul intervalliga 7-10 päeva. Mitte kasutada hiljem, kui 14 päeva enne saagikoristust.

Kasutamisjuhend ja kulunorm
Õun/pirn: Syllit 544 SC-d kasutada ennetavalt 1,25 l/ha alates väga varasest faasist kevadel kuni 60 päeva enne saagi koristust (alates kasvufaasist 01 kuni 89); maksimaalselt 2 pritsimiskorda aastas, minimaalne pritsimisintervall 7 päeva. Ravieesmärgil kasutada Syllit'it 24 tundi peale infektsiooni ilmnemist soojade ilmastiketingimuste korral või 48 tundi peale nakatumist jahedamate ilmastikutingimuste korral.

Kirss: Syllit 544 SC-d kasutada ennetavalt 1,25 L/ha alates õite avanemisest kuni 14 päeva enne saagi koristust (alates kasvufaasist 60 kuni kasvufaasini 79) ja/või peale saagi koristust; maksimaalselt 2 pritsimiskorda aastas, minimaalse pritsimisintervalliga 7 päeva.

Piirangud
Mitte pritsida õunviljalisi (õunad ja pirnid) hiljem, kui 60 päeva enne saagikoristust. Mitte pritsida kirsipuid hiljem, kui 14 päeva enne saagikoristust.

Töölahuse ettevalmistamine
Paak täita poolenisti veega, panna tööle pump, et toimuks paagis segamine, lisada Syllit 544 SC ja seejärel lisada ülejäänud vesi. Kasutada koheselt peale segamist. Rohkem lahust, kui koheseks tarvitamiseks vajalik, mitte valmistada.

Pritsi puhastamine
Peale pritsimist puhastage pritsipaak veega. Ülejäänud lahust kanalisatsiooni mitte valada, vaid pritsida sellega juba töödeldud aeda.

Hoiustamine ja jäätmete kõrvaldamine

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Hoida originaal-pakendis. Toode ja selle pakend tuleb hävitada ohutul viisil. Tühja pakendit uuesti mitte kasutada.

Resistentsus
Fungitsiidide kasutamisel võivad tekkida toimeaine suhtes resistentsed seenhaiguste tüved. Syllit 544 SC toimeaine kuulub FRAC (Fungitsiidide Resistentsuse Toime Komitee) grupi toimeainete hulka, mille toimeviis ei ole teada ja antud määrangu järgi loetakse resistentsuse tekke ohtu madalaks kuni keskmiseks. FRAC on teavitanud kirsi-lehevarisemistõve resistentsetest populatsioonidest.

Korduv töötlemine sarnaste toimeainetega preparaatidega suurendab resistentsuse riski. Riskide vähendamiseks ei tohi toodet kasutada rohkem kui kaks kord aastas/kasvuperioodil. Resistentsusriskide vähendamiseks on soovitav erineva toimeainega ja teadaolevalt hea efektiivsusega tooteid segada või vahetada. Fungitsiidide resistentsusriski saab vähendada töötlemisega infektsiooni ilmnemise varases staadiumis.