

TEPPEKI® INSEKTITSIID

Teppeki on valiva toimega insektitsiid, mis tõrjub enamlevinud lehetäiliste liike järgnevatelt kultuuridelt: suvi- ja talinisul, durum (spelta) nisul, suvi- ja talitritikalel, suvi- ja talirukkil, suvi- ja taliodral, suvi- ja talikaeral, rohelisel hernel (kaunadeta), kartulil, õuna- ja pirnipuul.

NB! Kuna Teppeki on laiendatud kapsastel, brüsseli kapsal, kirsil, ploomil, dekoratiivtaimedel, puukoolil, metsataimlale, maasikal, vaarikal, aedmurakal, sõstardel, põldoal, suhkru-, söödapeedil ning porgandil ja kasutamiseks kasvuhoones tomatil, baklažaanil, kurgil, puukoolil, metsataimlale ja dekoratiivtaimedel professionaalse kasutaja (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 51) taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Toimeaine: flonikamiid 500g/kg
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid (WG)
Eesti reg. number: 784.26.08.20
Pakend: 100 g, 140 g, 150 g Teppeki pakendatud pudelisse **250 mL** ; 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g Teppeki pakendatud pudelisse **500 mL**; 450 g, 500 g, 560 g, 700g, 1 kg Teppeki pakendatud pudelisse **1 L**; 2 kg Teppeki pakendatud pudelisse **3 L**
Tootmise kuupäev/ partii number: vt pakendit.
Aegumiskuupäev: 3 aastat.
Hoiustamine: kaitsta külma eest.

**Insektitsiidi Teppeki võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Enne toote kasutamist loe läbi toote märgistus!**

 Ettevaatust!	EUH401: Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. EUH 451: Võib põhjustada veevarude väga pikaajalist ja hajusat reostust. EUH208: Sisaldab: dinaatriummaleaati. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. P201: Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. P202: Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist. P264: Pärast käitlemist pesta hooliga vahendiga kokkupuutunud kehaosi. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätсед, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. P391: Mahavoolanud toode kokku koguda. P280: Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille või kaitsemaski. SP1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
--	--

	SPe8: Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel. Kui ei esine õitsvaid taimi, siis on lubatud kasutada ajavahemikus 22:00-05:00.
--	--

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Registreerimise haldaja, tootja ja pakendaja:

ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park,
DeKleetlaan 12B-box9
B-1831 Diegem, Belgium, Belgia
Tel.: +32 262 78611

Esindaja Eestis:

Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19A,
SE-212 25
Malmö, Sweden
Tel.: +370 648 93200
www.nordiskalkali.

KASUTAMINE

Teppeki on süsteemne selektiivne insektitsiid, mis tõrjub kõiki põhilisi lehetäiliste liike teraviljadel, rohelisel hernel, kartulil, õuna- ja pirnipuudel.

Toimemehhanism

Teppeki liigub taimes süsteemselt ja toimeaine liigub taimes üles. Tootel on ka translaminaarne toime st. toimeaine võib liikuda ühelt lehepoolelt teisele, mis omakorda tähendab, et tõrjub ka varjatud kohtades asuvaid lehetäisid.

Teppeki peatab preparaadiga kokkupuutunud putuka toitumise mõne tunni jooksul, pärast paari päeva sureb kahjur nälga. Toote mõju on näha 4-6 päeva pärast kasutamist. Putukad ei sure koheselt, kuid kultuuri kahjustumine lõpeb kohe pärast vahendi kasutamist. Täisnormi kasutamisel püsib efekt kuni 4 nädalat. Toote toimimist ei mõjuta kõrged ega madalad temperatuurid.

Kasutusjuhend:

Kultuur	Kahjurid	Kulunorm g/ha	Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajas	Kasutusaeg	Vee kulu l/ha	Märkused
Suvi- ja talinisu, spelta nisu, suvi- ja talitritikale, suvi- ja talirukis	Lehetäid	140	Pritsida 2 korda hooajal 3 nädalase intervalliga	Alates esimesest kõrvalvõrsest kuni piimküpsuse lõpuni (kasvufaas 21-77). Ainult kevadine kasutus lubatud.	150-300	Madalamat kulunormi kasutada väiksema kahjuri surve korral. Järgige kasutussoovitusi.

Suvi- ja talioder, suvi- ja talikaer	Lehetäid	140	Mitte rohkem kui 1 pritsimiskord hooajal	Alates esimesest kõrvalvõrsest kuni piimküpsuse lõpuni (kasvufaas 21-77). Ainult kevadine kasutus lubatud.	150-300	Madalamat kulunormi kasutada väiksema kahjuri surve korral. Järgige kasutussoovitusi.
Roheline hernes (kaunadeta)	Herne-lehetäi (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), Oa-lehetäi (<i>Aphis fabae</i>), Virsiku lehetäi (<i>Myzus persicae</i>)	140	Mitte rohkem kui 1 pritsimiskord hooajal	Pritsida alates kuuendast lihtsa pärislehe avanemisest kuni 10 % kaunadest on saavutanud ligikaudu täispikkuse, algab paisumine, terade konsistents nendes on vesine (kasvufaas 16-71). Ainult kevadine kasutus lubatud.	200-400	Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt 14 päeva enne koristust. Mitte kasutada koos õlide ja määrgajatega.
Kartul (Tööstuslik, tärklise- ja toidukartul)	Virsiku lehetäi (<i>Myzus persicae</i>) Türnpuu lehetäi (<i>Aphis nasturtii</i>) Suur kartuli lehetäi (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), Paakspuu- (kurgi-) lehetäi (<i>Aphis frangulae</i>)	160	Mitte rohkem kui 1 pritsimiskord hooajal	Alates tärkamisest, kuni viie kahetise pärislehe avanemiseni (kasvufaas 10-15)	200-500	Vee kogus sõltub kartuli suurusest. <u>Ära kasuta paagisegus õli sisaldavate toodetega</u>
Kartul (Seemneks)	Virsiku lehetäi (<i>Myzus persicae</i>) Türnpuu lehetäi (<i>Aphis nasturtii</i>) Suur kartuli lehetäi (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), Paakspuu- (kurgi-) lehetäi (<i>Aphis frangulae</i>)	160	Mitte rohkem kui 1 pritsimiskord hooajal	Alates tärkamisest, kuni viie kahetise pärislehe avanemiseni (kasvufaas 10-15)	200-500	Võib kasutada segus mineraalõlidega või paagisegudes õlipõhiste lisanditega.
Õunapuu	Õunapuu-lehetäi (<i>Aphis pomi</i>),	140	Maksimaalselt 3 pritsimiskorda	Pritsida alates õiepungade	200-1000	Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt

	Õunapuu- teelehe lehetäi (<i>Dysaphis plantaginea</i>)		hooajal, 3 nädalase intervalliga	paisumisest kuni õiepungade puhkemiseni (kasvufaas 51-59) ja pärast õitsemist, kuni viljad on saavutanud poole oma iseloomulikust suurusest (kasvufaas 71-75)		21 päeva enne koristust. Vee kogus sõltub puu suurusest, rohelise osa suurusest ja pritsimisest
Pirnipuu	Lehetäi liik (<i>Dysaphis pyri</i>)					
Kirsipuu	Lehetäid, Virsiku lehetäi (<i>Myzus persicae</i>), Kirsipuu-lehetäi (<i>Myzus cerasi</i>)	140	Pritsida 2 korda hooajal 3 nädalase intervalliga	Pritsida esimese lehe avanemisel (BBCH 11)	200- 1000	Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt 14 päeva enne koristust.
Ploomipuu	Lehetäid	140	Pritsida 2 korda hooajal 3 nädalase intervalliga	Pritsida esimese lehe avanemisel (BBCH 11)	200- 1000	Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt 21 päeva enne koristust.
Maasikas	Lehetäid	140	Pritsida 2 korda hooajal 7 päevase intervalliga	Pritsida kahjurite ilmumisel. Pritsida alates õiepungade paisumisest kuni õiepungade puhkemiseni (kasvufaas 55-59) ja pärast õitsemist, kuni viljad on saavutanud poole oma iseloomulikust suurusest (kasvufaas 71-87)	500- 2000	Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt 3 päeva enne koristust.
Vaarikas ja aedmurakas	Lehetäid	140	Pritsida 2 korda hooajal 7 päevase intervalliga	Pritsida kahjurite ilmumisel alates lehtede arengu algusest kuni õiepungade moodustumise lõpuni (BBCH 10- 59) ja pärast õitsemist alates viljade moodustumisest (BBCH 71).	1000	Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt 3 päeva enne koristust.
Sõstrad	Lehetäid	140	Pritsida 2 korda hooajal 7 päevase intervalliga	Pritsida kahjurite ilmumisel alates lehtede arengu algusest kuni õiepungade moodustumise lõpuni (BBCH 10- 59) ja pärast õitsemist alates	1000	Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt 10 päeva enne koristust.

				viljade moodustumisest (BBCH 71).		
Põlduba (kaunaga)	Lehetäid	140	Mitte rohkem kui 1 pritsimiskord hooajal	Põlduba kaunaga. Kasutamine pärast kahjustaja piirtaseme ületamist, mitte pritsida õitsmise ajal BBCH 61-69.	150-400	Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt 14 päeva enne koristust. Võib kasutada koos täiendavate õlide või määrgajatega.
Suhkru- ja söödapeet	Oalehetäi	140	Mitte rohkem kui 1 pritsimiskord hooajal	Kasutamine alates kuue pärislehe faasist kuni saagiks kasutatavad vegetatiivorganid on saavutanud oma sordiomase täissuuruse. Kevadest varasuvani.	200-600	Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt 60 päeva enne koristust.
Porgand	Porgandi-lehekirp, lehetäid	140	Pritsida 2 korda hooajal 3 nädalase intervalliga	Kasutamine alates tärkamisest kui teine leht või lehepaar on 1 cm pikkune kuni on saavutatud juurte tüüpiline vorm ja suurus (BBCH 12-49)	200-400	Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt 21 päeva enne koristust.
Peakapsas (valge, punane, kähär ehk savoia ja teravatipuline)	Lehetäid, Karilane	140	Pritsida 2 korda hooajal 3 nädalase intervalliga	Pritsida alates kuuenda lehe lahti keerdumisest kuni pea on omandanud oma tüüpilise suuruse ja kuju (BBCH 16-49)	200-400	Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt 14 päeva enne koristust.
Brüsseli kapsas (rooskapsas)	Lehetäid, Karilane	140	Pritsida 2 korda hooajal 3 nädalase intervalliga	Pritsida alates kuuenda lehe lahti keerdumisest kuni pea on omandanud oma tüüpilise suuruse ja kuju (BBCH 16-49)	200-400	Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt 14 päeva enne koristust.
Dekoratiivtaimed (Avamaal)	Lehetäid	140	Pritsida 2 korda hooajal 3 nädalase intervalliga	Pritsida kahjurite ilmnemisel	200-1000	
Dekoratiivtaimed (Kasvuhoones)	Lehetäid	1,4 g/100m ²	Pritsida 3 korda hooajal 3 nädalase intervalliga	Pritsida kahjurite ilmnemisel	2- 10 l/100 m ²	
Puukool (Avamaal)	Lehetäid	140	Pritsida 2 korda hooajal 3 nädalase intervalliga	Mai kuni september	200-1000	

Puukool (Kasvuhoones)	Lehetäid	1,4 g/100m ²	Pritsida 3 korda hooajal 3 nädalase intervalliga	Pritsida kahjurite ilmnemisel	2-10 l/100 m ²	
Metsataimla (Avamaal)	Lehetäid	140	Pritsida 2 korda hooajal 3 nädalase intervalliga	Mai kuni september	200- 1000	
Metsataimla (Kasvuhoones)	Lehetäid	1,4 g/100m ²	Pritsida 3 korda hooajal 3 nädalase intervalliga	Pritsida kahjurite ilmnemisel	2-10 l/100 m ²	
Tomat (Kasvuhoones)	Lehetäid	1,2 g/100m ²	Pritsida 2 korda hooajal 7 päevase intervalliga	Pritsida alates kuuendast pärislehest, kui see on varrel täielikult lahti volditud, BBCH 16	4-10 l/100 m ²	Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt 1 päev enne koristust.
Baklažaan (Kasvuhoones)	Lehetäid	1,2 g/100m ²	Pritsida 2 korda hooajal 7 päevase intervalliga	Pritsida alates kuuendast pärislehest, kui see on varrel täielikult lahti volditud, BBCH 16	4-10 l/100 m ²	Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt 1 päev enne koristust.
Kurk (Kasvuhoones)	Lehetäid	1,0 g/100m ²	Pritsida 2 korda hooajal 7 päevase intervalliga	Pritsida alates kuuendast pärislehest, kui see on varrel täielikult lahti volditud, BBCH 16	4-10 l/100 m ²	Viimane pritsimine tuleb teha hiljemalt 1 päev enne koristust.

RESISTENTSUSE VÄHENDAMISE MEETMED

Maksimaalset lubatud pritsimiskordade arvu ei tohi ületada. Resistentsuse tekkimise vältimiseks tuleb pritsimise vajadusel kasutada teise toimemehhanismiga tooteid. Teppeki kaitsev toime kastab 14 kuni 28 päeva. Sõltuvalt taimeliigist võib pritsida ühel hooajal 1-3 korda.

OHUTUSMEETMED

Lahjendamata tootega töötamisel ja saastunud pindade puudutamisel tuleb kanda kaitseriietust ja keemiliselt vastupidavaid kindaid. Teisi isikukaitsevahendeid võib kasutada, kui see tagab samaväärse kaitse.

PRITSIMISLAHUSE VALMISTAMINE

Enne pritsimislahuse valmistamist veenduge, et prits, pihustid jm agregaadid oleksid puhtad. Lisage pritsipaaki vähemalt 50% nõutavast vee kogusest, lülitage sisse segaja ning pidevalt segades lisage vajalik kogus Teppekit. Seejärel lisage ülejäänud vesi, pritsimislahust pidevalt segades. Valmis töölahust mitte seisma jätta, vaid alustada koheselt pritsimist ning hoida kogu pritsimise vältel segaja töös.

PRITSIMISSEADMETE PUHASTAMINE

Lisage pritsipaaki vesi ja aktiveeri segaja. Pesuvesi pritsida varem töödeldud alale. Ärge puhastage pritsimisseadet veekogude läheduses.

TÜHJADE PAKENDITE KÕRVALDAMINE

Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

HOIUSTAMINE

Hoida kasutamata toodet temperatuuril 0-32 °C, tihedalt suletuna, originaalpakendis, kuivas ja ventileeritud kohas. Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast. Hoida külmumise eest.

ESMAABI

Allaneelamisel: Loputada suud veega. Ärge kutsuge esile oksendamist.

Sissehingamisel: Koheselt viia kannatanu värske õhu kätte ja lasta puhata.

Kokkupuude nahaga: Pesta koheselt rohke vee ja seebiga.

Silma sattumisel: Loputada koheselt silmi (avatud silmalaugudega) rohke veega vähemalt 15 minutit, pöörduda arsti poole.

Kui iiveldus/ ärritus püsib, pöörduge arsti poole (võimaluse korral näidake etiketti).

TARNETINGIMUSED

Kõik tooted, mida ISK Biosciences Europe N.V. tarnib on kõrge kvaliteediga ja me usume, et need on sobivad, kuid kuna me ei saa kontrollida nende ladustamist, käitlemist, segamist või kasutamist või ilmastikutingimusi enne kasutamist, selle ajal või pärast seda, mis võib mõjutada toote toimimist ei saa tootja selle eest vastutada. Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest. Meie töötajad ja esindajad ei saa neid tingimusi muuta, sõltumata sellest, kas nad kontrollivad või abistavad selliste kaupade kasutamist. Kõik soovitused põhinevad meie praegustel teadmistel toote kasutamise kohta.