Ettevaatust

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

H315 Põhjustab nahaärritust.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H332 Sissehingamisel kahjulik.

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.

H373 Võib kahjustada elundeid (närvisüsteemi) pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas

P210 Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest mitte suitsetada.

P261 Vältida auru ja pihustatud aine sissehingamist.

P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.

P301+P310 Allaneelamise korral: võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga

P303+P361+P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all

P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P405 Hoida luku taga.

SP1 Mitte saastada vett toote või selle pakendiga (mitte puhastada pritsimisseadmeid pinnaveekogude lähedal, vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist maisil 25m, viinamarjadel 30m, dekoratiivtaimedel 20m, dekoratiivpuudel 40m ja teistel kultuuridel 10m pinnaveekogudest.



SPe8 Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel. Kui ei esine õitsvaid taimi, siis on lubatud kasutada ajavahemikus 22:00-05:00.

Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Kasutuspiirangud

Mittepritsitav puhvertsoon veekogudest: maisil 25 m, viinamarjadel 30 m, dekoratiivtaimedel 20 m, dekoratiivpuudel 40 m ja teistel kultuuridel 10 m veekogudest.

Esmaabi:

Nahaga kokkupuutel: Võta seljast määrdunud riided. Pese nahapinda seebi ja rohke veega. Kui ärritus on püsiv, pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: Loputa kiiresti rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul (silmalaud avatud). Kui punetus, kipitus, pisaravool püsivad, pöördu arsti poole.

Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Hingamisraskuste korral anda hapnikku. Kui hingamine on seiskunud, teha kunstlikku hingamist. Pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: loputada suud. Mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda koheselt arsti poole.

CYPERKILL® 500 EC

TAIMEKAITSEVAHEND. INSEKTITSIID

Kasutusvaldkond: kahjurite tõrjeks teraviljadel, rapsil, sinepil, linal, kartulil, juur- ja mugul-köögiviljadel, sibul-köögiviljadel, spinatil, kapsastel (ristõielistel köögiviljadel), liblikõielistel köögiviljadel, maisil, viinamarjal, dekoratiivtaimedel ja -puudel.

Toimeaine: tsüpermetriin 500 g/l
Preparaadi vorm: emulsioonkonsentraat
Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendil!
Registreerimisnumber: 0391/02.02.11
Pakend: 100 ml, 250 ml,
500 ml, 1 l, 5l, 10l ja 20l

Cyperkill 500 EC võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb jälgida kasutusjuhendi nõudeid! Tuleohtlik!

Loa valdaja Arysta LifeScience Benelux sprl

Tootja/pakkija:

Arysta LifeScience

Arysta LifeScience Benelux sprl
Rue de Renory, 26/1
B-4102 Ougrée
BELGIUM (Europe)

Maaletooja ja turustaja:

Baltic Agro AS
Rukki tee 8, Lehmja küla,
75306 Rae vald, Harjumaa
Tel.: 606 22 60
Faks: 606 22 78

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Pakendi purunemisel
Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga kuni preparaat on täielikult läbi imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Hädaabi telefon: 112
Pakend: 1 liiter

Toote kirjeldus
Cyperkill 500 EC on laia toimespektriga, pika järelmõjuga kontaktne insektitsiid. Parema tulemuse saavutamiseks tuleb pritsimise ajal jälgida, et põllule ei jääks pritsimata triipe. Suuremat kulunormi kasutatakse ebasoodsate ilmastikutingimuste ja kahjurite suurema arvukuse korral.

Ettevalmistus
Enne pritsimissegu valmistamist veendu, et pritsipaak ja pihustid oleks puhtad.
Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Lisa vajalik kogus Cyperkill 500 EC-d ja lahust samaaegselt segades täida ülejäänud paak veega. Segisti jätta tööle nii transportimisel kui pritsimisel.

Segatavus teiste preparaatidega
Cyperkill 500 EC võib segada kõikide enamlevinud herbitsiididega, fungitsiididega või insektitsiididega.

Puhastamine
Enne pritsimissegu valmistamist ja pärast Cyperkill 500 EC kasutamist tuleb prits hoolikalt puhastada. Selleks võib kasutada tavalist soodat 2-4 kg lisatuna 100 l pesuveele või spetsiaalset paagipesuvahendit.

Säilitamine
Hoida kuivas ja jahedas kohas, eraldi loomasöödast, joogist ja toiduainetest. Kinnises originaalpakendis ja õigetes tingimustes säilib preparaat vähemalt 2 aastat alates valmistamise kuupäevast.

Jäätmete ja taara kahjutustamine
Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga kuni preparaat on täielikult läbi imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Kasutamine, kulunormid
Teravili 0,05 l/ha
Ripslased, lehetäid, maakirbud, viljakärbes, ööläsed. Põldu pritsitakse kasvuajal kahjurite ilmumisel. Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 28 päeva, tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 1.
Viiruskandjate lehetäide tõrjeks pritsitakse teravilja tärkamisest loomise alguseni.

Suvi- ja taliraps, sinep 0,05 l/ha
Maakirbud, peitkärsakad, hiilamardikad. Hiilamardikate tõrjeks pritsitakse enne õitsemist, maakirbu tõrjeks tõusmete faasis, varre-peitkärsaka tõrjeks kui taime vars hakkab pikenema. Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 49 päeva, tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 14 päeva.

Kartul 0,05-0,06 l/ha
Kartulimardikas, lehetäid. Põldu pritsitakse kasvuajal kahjurite ilmumisel. Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 7 päeva, tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall pritsimiste vahel 10 päeva.

Mais 0,05-0,15 l/ha
Viimane pritsimisaeg on BBCH 67 (täisõitsemiseni). Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall pritsimiste vahel 10 päeva. Tööoode 5 päeva.

Hernes, uba, lupiin, roheline hernes ja roheline uba 0,05 l/ha
Hernekärsakad, lehetäid. Hernekär-saka tõrjeks pritsitakse tõusmete faasis, oal ja lupiinil lehetäide tõrjeks esimeste täikolooniate ilmumisel kuni õitsemise alguseni (BBCH 59). Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 14 päeva, rohelisel hernel ja oal 7 päeva, tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 10 päeva.

Lina 0,05 l/ha
Linakirp, ripslased, lina-tähtöölane. Põldu pritsitakse kahjurite ilmumisel. Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 49 päeva, tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 14 päeva.

Kapsas (lillkapsas, brokoli, peakapsas, brüsseli kapsas) 0,05 l/ha.
Maakirbud, suur ja väike kapsaliblikas, peitkärsakad, kapsaöölane, kapsakoi, lehevaablane, kapsakärbes, kapsa-tuhktäi. Põldu pritsitakse kahjurite ilmumisel. Ooteaeg viimasest töötlemisest saagikoristuseni vähemalt 7 päeva, tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 10 päeva.

Juurviljad ja juur- köögiviljad – porgand, peet (suhkru-, looma- ja punapeet), kaalikas, naeris, redis, rõigas, mustjuur, mädarõigas, petersell, seller, spinat, pastinaak, lehtpeet 0,05 l/ha.
Lehetäid, maakirp, porgandikärbes, porgandi-lehekirp. Porgandikärbse tõrjeks pritsitakse porgandikärbse lendluse ajal, porgandi-lehekirbu tõrjeks esimeste kahjustustunnuste ilmumisel. Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 7 päeva, peetidel, kaalikal, naeril, lehtpeedil 14 päeva; tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 10 päeva.

Mugulsibul, küüslauk, porru, šalott 0,05 l/ha.
Ripslased, sibulakoi. Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 7 päeva, tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 10 päeva.

Spargel 0,05 l/ha. Pritsitakse pärast saagi koristust. Tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 10 päeva.

Viinamari 0,06 l/ha
Mähkurid, lehekirbud. Pritsitakse kahjurite ilmumisel. Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 21 päeva, tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 1.

Dekoratiivtaimed 0,05-0,1 l/ha
Lehetäid, leheröövikud, ripslased, lutikad, kaevandikärbsed, kilptäid, mardikad, kärsakad jt. Kärsakate ja lehetäide tõrjeks pritsitakse kulunormiga 0,05-0,1 l/ha.
Tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 10 päeva.

Dekoratiivpuud 0,03-0,1 l/ha
Lehetäid, leheröövikud, ripslased, lutikad, kaevandikärbsed, kilptäid, mardikad, kärsakad jt. Kärsakate ja lehetäide tõrjeks pritsitakse kulunormiga 0,03-0,1 l/ha.
Tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 10 päeva.

Vee hulk: 200 - 300 l/ha

Kasutaja risk

Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisjuhend ning soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutus-meetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms.

Ettevaatust

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H315 Põhjustab nahaärritust.
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H373 Võib kahjustada elundeid (närvisüsteemi) pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime .
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P210 Hoida eemal. soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest – mitte suitsetada.
P261 Vältida auru ja pihustatud aine sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.
P301+P310 Allaneelamise korral: võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEG või arstiga.
P303+P361+P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P405 Hoida luku taga.
SP1 Mitte saastada vett toote või selle pakendiga (mitte puhastada pritsimisseadmeid pinnaveekogude lähedal, vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhtervöödist maisil 25m, viinamarjadel 30m, dekoratiivtaimedel 20m, dekoratiivpuudel 40m ja teistel kultuuridel 10m pinnaveekogudest.



SPe8 Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel. Kui ei esine õitsvaid taimi, siis on lubatud kasutada ajavahemikus 22:00-05:00.

Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Kasutuspiirangud

Mittepritsitav puhvertsoon veekogudest: maisil 25 m, viinamarjadel 30 m, dekoratiivtaimedel 20 m, dekoratiivpuudel 40 m ja teistel kultuuridel 10 m veekogudest.

Esmaabi:

Nahaga kokkupuutel: Võta seljast määrdunud riided. Pese nahapinda seebi ja rohke veega. Kui ärritus on püsiv, pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: Loputa kiiresti rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul (silmalaud avatud). Kui punetus, kipitus, pisaravool püsivad, pöördu arsti poole.
Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Hingamisraskuste korral anda hapnikku. Kui hingamine on seiskunud, teha kunstlikku hingamist. Pöörduda arsti poole.
Allaneelamisel: loputada suud. Mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda koheselt arsti poole.

CYPERKILL® 500 EC

TAIMEKAITSEVAHEND. INSEKTITSIID

Kasutusvaldkond: kahjurite tõrjeks teraviljadel, rapsil, sinepil, linal, kartulil, juur- ja mugul-köögiviljadel, sibul-köögiviljadel, spinatil, kapsastel (ristõielistel köögiviljadel), liblikõielistel köögiviljadel, maisil, viinamarjal, dekoratiivtaimedel ja –puudel.

Toimeaine: tsüpermetriin 500 g/l
Preparaadi vorm: emulsioonkonsentraat
Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendil!
Registreerimisnumber: 0391/02.02.11
Pakend: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5l, 10l ja 20l

Cyperkill 500 EC võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb jälgida kasutusjuhendi nõudeid! Tuleohtlik!

Loa valdaja Arysta LifeScience Benelux sprl

Tootja/pakkija:

Arysta LifeScience Benelux sprl
Rue de Renory, 26/1
B-4102 Ougrée
BELGIUM (Europe)

Maaletooja ja turustaja:

Baltic Agro AS
Rukki tee 8, Lehmja küla,
75306 Rae vald, Harjumaa
Tel.: 606 22 60
Faks: 606 22 78