

Tazer 250 SC
Taimekaitsevahend
Fungitsiid

Laiaspektriline süsteemse toimega fungitsiid lehelaiksuste, roostete ja teiste haiguste tõrjeks nisul ja odral, ristõieliste mustmädaniku, kuivlaiksuse, valgemädaniku, hahkhallituse ja jahukaste tõrjeks rapsil, kuivlaiksuse ja mustkärna tõrjeks kartulil, ristõieliste kuivlaiksuse tõrjeks lillkapsal, brokolil.

Preparatiivne vorm: Suspensioonikontsentraat.

Toimeaine: 250 g/l asoksüstrobiin.

Pakend: 1 l, 5 l, 10 l

Tazer'it võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toode sisaldab ohtlikke aineid asoksüstrobiin, propaan-1,2-diool ja etoksüülitud alkohol.



Hoiatus!

H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda.

P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike jäätmete käitleja poolt.

SP1 - Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist. Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada. Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.

SPe3 - Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m pinnaveekogudest.

Säilitamine: Hoida vaid originaalpakendis. Pakendit säilitada tihedalt suletuna kuivas, pimedas, jahedas ja hea ventilatsiooniga suletud ruumis. Säilitamistemperatuur 0⁰ kuni +35⁰C, mitte lasta külmuda.

Säilitamisaeg: kinnises originaalpakendis 2 aastat valmistamise kuupäevast.

Eesti registreerimise nr. 0485/08.10.12

Partii number/valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.

Loa haldaja:

Nufarm GmbH&Co KG,

St.-Peter-Strasse 25,

A-4021 Linz,

Austria

Tootja:

Nufarm S.A.S.
28, Boulevard Camélinat - BP 75
F-92233 GENNEVILLIERS Cedex
Prantsusmaa

Toote maaletooja ja turustaja:

AS Baltic Agro
Peterburi tee 44,
11415Tallinn
Tel.: + 372 606 2286

AS Farm Plant Eesti
Tartu mnt 56, Ülenurme,
61714Tartumaa
Tel.: + 372 736 7087

ESMAABI:

Halva enesetunde korral töö katkestada.

Mis tahes õnnetuse puhul on soovitatav konsulteerida arstiga. Arstile näidata vastava taimekaitsevahendi etiketti.

Kui taimekaitsevahend on sattunud nahale, tuleb vastavat kohta viivitamatult pesta voolava veel all umbes 15 minutit.

Kui taimekaitsevahend on sattunud silma, tuleb neid viivitamatult loputada voolava veel all umbes 15 minutit.

Kui taimekaitsevahend on sattunud hingamissüsteemi, viia kannatanu värske õhu kätte.

Kui taimekaitsevahend on sattunud seedetrakti, ei tohi oksendamist esile kutsuda, kannatanu tuleb viia raviautusse.

Meditiiniline abi: kannatanule tuleb anda meditsiinilist aktiivsütt. Maoloputuse tegemisel kaitsta hingamisteid väljatuleva massi sissehingamise eest.

Isiklik ohutus. Preparaadi säilitamisel, transportimisel ja kasutamisel tuleb järgida kõiki keskkonnakaitse, tööohutuse ja isikliku hügieeni eeskirju. Töötsoonis on söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Töö tegemisel tuleb kanda peakatet, kasutada kaitseprille ja –kindaid, kinniseid jalanõusid. Töö lõpetamisel tuleb iga kord end hoolikalt pesta ja riided vahetada. Ka individuaalsed kaitsevahendid tuleb hoolikalt puhastada ja pesta.

SOOVITUSED KASUTAMISE KOHTA**Preparaadi kirjeldus.**

Toimeaine: 250 g/l asoksüstrobiini (metüül(E)-2-{2-[6-(2-tsüanofenoksü)pürimidiin -4-iloksi]fenüül}-=3-metoksüakrülaat).

Füüsilised omadused: helepruun läbipaistmatu vedelik.

Asoksüstrobiin on strobiluriinide rühma fungitsiid, mis tagab pikaajalise kaitse laia spektri teraviljahaiguste vastu. Sellel on süsteemne, translaminaarne ja kaitsev toime. Asoksüstrobiin pärsib spooride moodustumist ja seenemütseeli arengut taime pealispinnal ning samuti haustorite moodustumist taime epidermi rakkudes. Biokeemiliselt pärsib asoksüstrobiin seenerakkude mitokondrite hingamist ja väldib elektronide ümberpaiknemist seenerakkudes.

Kultuurtaimede vastupidavus. Kasutada Tazer 250 SC kasutusjuhendi kohaselt. Kultuuride taluvus Tazer 250 SC suhtes on hea.

KASUTUSTINGIMUSED JA DOOSID:

Kasutusaeg:

Nisu ja oder. Parima kaitse tagab profülaktiline töötlemine või pritsimine haiguse kõige varasemates arengustaadiumides. Optimaalne kasutusaeg on alates teravilja esimest kõrresõlmest kuni lipulehe keelekesse ilmumiseni (31. kuni 39. arengustaadium). Kasutades toodet varte moodustumise ajal on kaitse kestus 4-6 nädalat. See võib olla ka pikem, kui toodet kasutada viljapea tekkimise ajal. Vegetatsiooniperioodi teises pooles tagab toote Tazer 250 SC pritsimine teraviljade suurepärase kaitse viljapea haiguste eest.

Tali- ja suviraps. Valgemädaniku, hahkhallituse ja ristõieliste kuivlaiksuse tõrjeks pritsida, kui haiguse arenguks on (prognoosi kohaselt) soodsad tingimused. BBCH 61-69 – õitsemise algus kuni lõpp.

Kartulid. Kartuli-kuivlaiksusega võitlemiseks pritsitakse haiguse esimeste tunnuste tekkides (AS 31 – 91 võrsumine kuni lehtede hävimine).

Lillkapsas, brokoli. Ristõieliste kuivlaiksuse tõrjeks pritsitakse leheroseti moodustumise ajal.

Töödeldav kultuur	Kahjulik organism	Annus, l/ha	Töötlemisaeg, juhised, märkused	Oote-aeg, päeva	Maksi-maalne töötlemiste arv hooajal	Vee kogus l/ha
Nisu	Kõrreliste jahukaste (<i>Erysiphe (Blumeria) graminis</i> , pruunrooste (<i>Puccinia recondita</i>), nisu helelaiksus (<i>Septoria (Leptosphaeria) nodorum</i>), nisu-helelaiksus (<i>Mycosphaerella graminicola/ Septoria tritici</i>), nisu-triiptõvik (<i>Drechslera/Pyrenophora tritici-repentis</i>), (<i>Microdochium nivale</i>), <i>Fusarioos</i> , <i>Cladosporium</i> sp.	1,0	kevadel (BBCH 31 – 69, esim. kõrresõlm kuni õitsemise lõpp)	35	1 -2	100 - 300
Oder	Kõrreliste jahukaste (<i>Blumeria (Erysiphe) graminis</i>), triiptõbi odral (<i>Pyrenophora teres</i>), odra-leherooste (<i>Puccinia hordei</i>), kõrreliste äärislaiksus (<i>Rhynchosporium secalis</i>), fusarioosid (<i>Fusarium spp</i>)	1,0	kevadel (BBCH 31 – 59, esim. kõrresõlm kuni loomise lõpp)	35	2	100 - 300
Tali- ja suviraps	Ristõieliste kuivlaiksus (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Alternaria sp.</i>), ristõieliste kuivmädanik, hahkhallitus (<i>Botrytis cinerea / Botryotinia fuckeliana</i>),	1,0	kevadel (BBCH 61 – 69, õitsemise algus kuni lõpp)	21	1	100 - 500

	ristõieliste mustmädanik (<i>Leptosphaeria maculans</i>), velgemädanik (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), ristõieliste jahukaste (<i>Erysiphe cruciferarum</i>)					
Kartul	Kartuli-kuivlaiksus (<i>Alternaria solani</i>), (<i>Alternaria sp.</i>) Kartuli-mustkärn (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0,5	haiguse esimeste tunnuste tekkides (BBCH 31 – 91)	7	2 -3	100 - 400
Lillkapsas, brokoli	Ristõieliste kuivlaiksus (<i>Alternaria brassicae</i>)	1,0	BBCH 35 – 39, leheroseti moodustumine	14	1 -2	200 - 600

Ooteaeg. Ajavahemikud töötlemise ja saagi korjamise vahel peavad teravilja puhul olema vähemalt 35 päeva, rapsi puhul 21 päeva, kartulite puhul 7 päeva, lillkapsa, brokoli puhul 14 päeva.

Kasutamistehnoloogia. Kasutatakse pritsi, mille töörihk on 2-5 baari. Reguleerida poomi kõrgus olenevalt pihusti töö nurga asetusest 30-50 cm taimede kohale.

Taimi ei tohi pritsida, kui tuule kiirus on suurem kui 4 m/s ega juhul, kui taimed on märjad või kui on oodata vihma. Mitte pritsida kuuma ilmaga.

Töölahuse valmistamine.

Veenduge, et pritsipaak on puhas. Arvutage välja vajalik töölahuse kogus, et vältida töölahuse ülejäägi tekkimist. Anum täita veega poolenisti (1/2). Enne kasutamist loksutage preparaadi mahutit korralikult! Kallake pritsipaaki vajalik kogus Tazer 250 SC, lülitage segisti sisse ja täitke paak ülejäänud vajamineva veega. Segamist jätkake ka pritsimise ajal. Tühjad mahutid loputada kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada töölahusesse. Valmissegatud töölahust ei tohi paaki pikaks ajaks (nt lõunasöögi ajaks või ööseks) seisma jätta.

Paagisegud. Toodet Tazer 250 SC võib kasutada segus enamike laialdasemalt kasutatavate pestitsiididega. Spetsiifilised omavahel segamise piirangud ei ole küll teada, kuid kahtluse korral pidage nõu ettevõtte esindustega.

Keskkonnakaitse nõuded.

Veeorganismidele väga toksilise mõjuga, võib pikaajalises perspektiivis veekeskkonda soovimatult mõjutada. Keskkonnasaaste vältimiseks hoida originaalpakendis. Vältida taimekaitsevahendi ja selle pakendi vette sattumist, pritsimistehnikat veekogude ja pinnavee lähedal mitte puhastada. Vältida saastamist läbi hoovide ja teede drenaažide. Pritsi tühjendamine või pesemine puude või muude taimede ja veekogude läheduses on keelatud. Taimekaitsevahendi kasutamisel järgida Hea põllumajandustava/taimekaitsetava soovitusi.

Saastunud mulla puhastamine. Lekkinud preparaat koguda kokku liiva, saepuru või mullaga, seejärel tuleb kemikaaliga läbiimbunud materjal kokku koguda erimärgistusega konteinerisse ning anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Pakendi likvideerimine. Tühja taarat on keelatud muul otstarbel kasutada. Pärast tühjendamist tuleb seda veega vähemalt 3 korda koheselt loputada, loputusvesi valada pritsimislahusesse. Tühi taara koguda kokku ning viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Juriidiline vastutus. Kasutaja vastutab preparaadi kasutamisest tekkiva kahju eest kõikidel juhtudel, millele tootja ei saa kontrolli kohaldada. Kõik soovitused tuginevad tootja teadmistel preparaadist. Tootja garanteerib ettevõtte originaalpakendis oleva toote kvaliteedi. Tootja ei vastuta kahju eest, mille põhjuseks on preparaadi vale säilitamine või kasutamine, kuna neile protsessidele tootja kontrolli kohaldada ei saa.