

Frowncide

Taimekaitsevahend

Fungitsiid

Preparaadi vorm: Suspensioonikontsentraat

Kasutusala: Fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks ja mugulate pruunmädanikku nakatumise vältimiseks.

Toimeaine: 500 g/l fluasinaam

Sisaldab ohtlikku ainet fluasinaam.

Eesti reg-nr 0530/21.08.14

Pakendid: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Valmistamise kuupäev ja partii nr: vaata pakendilt.

Frowncide'i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Kasutuspiirang: Ei tohi kasutada lähemal kui 10 m pinnaveekogude veepiirist.

Loa valdaja: ISK Biosciences Europe N.V., Pegasuspark, De Kletlaan 12 b, Box 9, 1831 Diegem, Belgia

Valmistaja/pakendaja: ISK Biosciences Europe N.V., Diegem - Belgia

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Keskkonnohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara –ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Pakendi purunemisel: Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Hoiutingimused: Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 3 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla 0°C ja üle +35 °C. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.



:

Hoiatus

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H361d Arvatavasti kahjustab loodet.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EUH401 Vältimaks ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale, järgi kasutusjuhendi nõudeid.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist.

P280 Kanda kaitsekindaid / kaitseriietust / kaitseprille / kaitsemaski.

P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega ja seebiga.

P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P501 Sisu / konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist 10 m pinnaseveekogudest.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Hoiutingimused: Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 3 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla 0°C ja üle +35 °C. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

Pakendi purunemisel: Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Pakendi kahjutustamine: Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Esmaabi

Mistahes mürgitusnähu ilmnemisel kutsuge arst ja kasutage juhendis kirjeldatud esmaabimeetmeid. **Vastumürk:** Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe neid nahapindu, kuhu toode on sattunud, rohke vee ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on allaneelatud suur kogus kontsentrati, pöörduge arsti poole. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.

Keskkonnaohtlikkus

Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara –ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

Kasutamine

Frowncide on kaitsev kontaktse toimega preparaat.

-PRITSIDA TULEB PROFÜLAKTILISELT, ENNE HAIGUSE ILMUMIST.

-PRITSIDA MAKSIMAALSELT KUNI 8 KORDA HOOAJA JOOKSUL. Intervall 7-10 päeva sõltuvalt haiguse intensiivsusest.

Esimest korda tuleb Frowncide-ga pritsida, kui ilm on haiguse levikuks soodne, HILJEMALT ENNE kartulitaimede kokkukasvamist vagudes.

Soovitav on pritsida pärast süsteemse ja kontaktse Ridomil Gold MZ 68 WG või pärast Revus-ga pritsimist.

Pritsimiste vahe:

Väike oht: 14 päeva profülaktiliselt, enne lehemädanikule soodsate tingimuste tekkimist.

Suur oht: 10 päeva (niiske, soe ilm)

Tõsine oht: 7 päeva pikaajaline soe ja niiske ilm, läheduses lehemädaniku lööbimine.

Kulunorm: 0,3 – 0,4 l/ha

Lubatud pritsimiskordade arv: 8

Töölahuse kulunorm: 200-500 l/ha

Ooteaeg: 7 päeva

Tähelepanu kasutamisel

Fungitsiidi valem kasutamisel muutuvad kartuli-lehemädanikku tekitava seene tüved tõrjevahendile vastupidavaks, mistõttu preparaadi efektiivsus võib kahaneda ja saak väheneda. Seepärast tuleb kulunormi ja pritsimiskordade soovist täpselt kinni pidada.

Paagisegud

Frowncide'i sobib kasutada koos Karate Zeon'i, Actara 25 WG-ga ja Reglone Super'iga. Samuti mangaan- ja magneesiumsulfaadiga. Kahtluse korral tuleb paagisegu sobivust eelnevalt väikesel pinnal katsetada.

Töölahuse valmistamine

Pritsipaak täita poolenisti veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus Frowncide'i pritsipaaki ja täita paak veega, jätkates segamist. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Pritsi puhastamine

Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Resistentsus

Toote korduv kasutamine võib põhjustada lehemädaniku resistentsust. Resistentsete seenetüvede kahtluse korral kasutage integreeritud taimekaitset. Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate soovitude saamiseks võtke palun ühendust toote edasimüüjaga.

Juriidilised aspektid ja kasutaja risk

Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend.

Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest.

Olemasolevate või tekkivate resistentsete seenetüvede vastu võivad fungitsiidid osutada väheefektiivseteks ning selle tulemusel saak väheneb. Kuna kõnealuste tüvede esinemist ei saa eelnevalt kindlaks määrata, ei vastuta tootja ega selle edasimüüja kahju korvamise eest, mille on põhjustanud fungitsiidi ebatõhusus resistentsete tüvede korral.

Kõik soovitusel toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna tootja ei saa kontrollida toote kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle eest vastutada.

Valmistaja: ISK Biosciences Europe N.V., Diegem, Belgia