

PROFI MCPA 750 SL

Taimekaitsevahend

Herbitsiid

Toimeaine sisaldus: 750 g/l MCPA

Preparaadi vorm: vesilahus

Kasutusala: Lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suvi- ja taliteraviljades

Eesti reg-nr: 0606/30.03.16

Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.

Pakend: 1, 5, 10, 20 ja 200 l

Toote valmistaja:

CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna

ul. Chemików 1,

37-310 Nowa Sarzyna,

Poola

Tel.: (0-17) 24 07 122, faks: (0-17) 24 07 111, e-post: sarzyna@ciechgroup.com

Maaletooja:

Agrimatco Eesti AS, Kalmistu tee 26N, 11216 Tallinn; tel: (+372)6141635

UAB Scandagra, Biochemikų g. 6, Kėdainiai, LT 57234, Leedu; tel: +370 347 41 551, faks: +370 347 41 552, info@scandagra.lt

PROFI MCPA 750 SL-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.



Ettevaatust

H302 - Allaneelamisel kahjulik.

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

P264 – Pärast käitlemist pesta hoolega käed.

P270 – Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

P280 – Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P301+P312 – ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

P305+P351+P338 – SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310 – Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

P501 – Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.

SP1 – Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

EUH401 – Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

Sisaldab ohtlikku ainet – MCPA dimetüülamiini sool.

Keskkonnoahtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara – ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

TOIME KIRJELDUS

Vahend imbub põhiliselt umbrohtude lehtedesse, põhjustades nende deformeerumise, mille tagajärjel taimede kasv aeglustub ja nad kärbuvad. Kõige efektiivsemalt hävitab vahend umbrohtusid, mis on 2-6 lehe faasis.

TOIME UMBROHTUDELE

Tundlikud umbrohud:

Taliteraviljad (talioder, talinisu, talitritikale ja rukis): kukemagun, harilik hiirekõrv, põld-litterhein.

Suvioder: põldkannike, iminõges, valge hanemalts, kukemagun, kare kõrvik, harilik nälghein, harilik hiirekõrv, põld-litterhein.

Suvinisu, suvitritikale, kaer: põldkannike, valge hanemalts, kukemagun, kare kõrvik, harilik nälghein, põld-litterhein.

Keskmiselt resistentsed umbrohud: vesihein, põld-konnatatar

Resistentsed umbrohud: harilik kesalill, roomav madar, põldmailane, üheidulehelised umbrohud.

KASUTAMINE, PRITSIMISE AEG JA KULUNORMID

SUVITERAVILJAD

(suvioder, suvinisu, suvitritikale, kaer).

Pritsida kevadel tärkamisjärgselt, alates kultuuri võrsumise algusest kuni lõpuni (BBCH 20-29). Kõige efektiivsem on pritsida umbrohtude 2-6 lehe faasis.

Kulunorm: 0,75 l/ha.

TALITERAVILJAD

(talioder, talinisu, talitritikale ja rukis).

Pritsida kevadel tärkamisjärgselt, alates kultuuri võrsumise algusest kuni lõpuni (BBCH 20-29). Kõige efektiivsem on pritsida umbrohtude 2-6 lehe faasis.

Kulunorm: 1,0 l/ha.

Soovitav veehulk: **200-300 l/ha.**

Soovitav pritsimisviis: **keskmise suurusega tilgad**

KÜLVIKORD

Herbitsiidiga pritsitud teraviljapõllu likvideerimise vajadusel (taimede hävinemisel külmade, haiguste või kahjurite tõttu) võib pärast külvieelse kultiveerimise teostamist kasvatada teisi kultuure, välja arvatud herbitsiidi suhtes eriti tundlikke kultuure nagu näit. tomatid, peedid.

Ooteaeg: puudub

Pritsimiskordi: 1

PRITSIMISSEGU VALMISTAMINE

Enne pritsimissegude valmistamist tuleb täpselt määratleda selle hulk.

Vajalik kogus PROFI MCPA 750 SL-i valada sisselülitatud segistiga pritsipaaki, mis on osaliselt täidetud veega. Tühjendatud pakendid loputada kolm korda veega ja loputusvesi valada pritsipaaki. Vajaliku hulga töölahuse saamiseks lisada pritsipaaki vett.

Pritsida töötava segistiga. Juhul, kui pritsimisseadmel puudub segisti, tuleb pritsimisseadme paagis olevat vedelikku segada mehaaniliselt.

Juhul, kui pritsimise käigus tekivad pikemad vaheajad, tuleb enne uuesti tööle asumist vedelik pritsipaagis hoolikalt segada.

Pärast pritsimise lõpetamist tuleb seade hoolikalt puhtaks pesta.

Mõningate taimede suure tundlikkuse tõttu isegi väikese koguse taimekaitsevahendi suhtes, on väga oluline pritsimisseadme pesemine pärast tööd ja eriti enne selle kasutamist teiste kultuuride pritsimisel.

SÄILITAMINE

Säilitada ainult originaalpakendis, mitte madalamal temperatuuril kui 0° C ja kõrgemal kui 30° C.

Säilivusaeg 3 aastat.

TAIMEKAITSEVAHENDI OHUTU KASUTAMISE TINGIMUSED

- Vahendit ei tohi kasutada:

- põuaperioodil,
- haigetel, vigastatud või märgadel taimedel,
- temperatuuril alla 10°C ja üle 25°C,
- perioodil, kui öine temperatuur langeb alla 5°C,
- enne lähenevaid öökülmasid ja vihma,
- tuulega üle 4 m/s, mis võiks pritsimissegude kanda naabruses kasvavatele taimedele.

Pakendi purunemisel. Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Pakendi kahjutustamine. Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

ESMAABI

Nahale sattumisel võtta kohe seljast määrdunud riided. Pesta saastunud nahapinda rohke veega.

Allaneelamise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole, näidata pakendit või etiketti.

Sissehingamisel viia kannatanu värske õhu kätte. Pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel loputada silmi rohke veega mitme minuti jooksul.

Vastumürk puudub. Ravi sümptomaatiline.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.