

## Ettevaatust

**H226 Tuleohtlik vedelik ja aur**

**H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav**

**H315 Põhjustab nahaärritust**

**H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi**

**H332 Sissehingamisel kahjulik**

**H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust**

**H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust**

**H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime**

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas

P210 Hoida eemal

soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest

pindadest. – Mitte suitsetada

P261 Vältida auru ja pihustatud aine sissehingamist

P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille, kaitsemaski

P301+P310 Allaneelamise korral: võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/  
P303+P361+P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast.

Loputada nahka veega / loputada duši all.

P331 MITTE kutsuda esile oksendamist

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda


P405 Hoida luku taga

P501 Sisumahu kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele

SP1 Mitte saastada vett toote või selle pakendi(mitte puhastada pritsimiseseadmeid pinnaveekogude lähedal, vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide)

SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist maisil 25 m, viinamarjadel 30 m, dekoratiivtaimedel 20 m, dekoratiivpuudel 40 m ja teistel kultuuridel 10 m pinnaveekogudest.

SPe8 Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel. Kui ei esine õitsvaid taimi, siis on lubatud kasutada ajavahemikus 22:00-05:00.



**Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit**

# WIZARD® 500EC

## TAIMEKAITSEVAHEND. INSEKTITSIID

**Kasutusvaldkond:** kahjurite tõrjeks teraviljadel (suvi- ja talinisu, suvi- ja talioder, kaer, talirukis, tritikale), rapsil, sinepil, linal, kartulil, juur- ja mugul- köögiviljadel, sibul-köögiviljadel, spinatil, kapsastel (brokoli, pea-, lill-, brüsseli kapsas), liblikõielistel köögiviljadel (hernes, pölduba), maisil, viinamarjal, dekoratiivtaimedel ja -puudel.

Toimeaine: tsüpermetriin 500 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonkonsentraat

Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendilt!

Registreerimisnumber: 0489/11.01.13

**Pakend:** 1 liiter

WIZARD 500EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

**Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb jälgida kasutusjuhendi nõudeid! Tuleohtlik!**

**Loa valdaja:** ProEuro Sp. z o. o.

### Tootja/pakkija:

ProEuro Sp. z o. o.  
Ul. Stary Rynek 25/4  
65-067 Zielona Góra  
Poola  
E-mail:  
info@proeuro.eu

### Maaletooja ja turustaja:

BaltChem OÜ  
K. Kärberi 4-164  
Tallinn 13812  
Eesti  
Tel: (372)58143080

### **Kasutuspiirangud**

Mittepritsitav puhvertsoon veekogudest: maisil 25 m, viinamarjadel 30 m, dekoratiivtaimedel 20 m, dekoratiivpuudel 40 m ja teistel kultuuridel 10 m veekogudest.

### **Hoiatus**

Õitsvat hernel, uba ja lupiini ja umbrohtu on keelatud pritsida!

### **Esmaabi:**

Nahaga kokkupuutel: Võta seljast määrdunud riided. Pese nahapinda seebi ja rohke veega. Kui ärritus on püsiv, pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: Loputa kiiresti rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul (silmalaud avatud). Kui punetus, kipitus, pisaravool püsivad, pöördu arsti poole.

Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Hingamisraskuste korral anda hapnikku. Kui hingamine on seiskunud, teha kunstlikku hingamist. Pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: loputada suud. Mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda koheselt arsti poole.

**Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.**

#### **Pakendi purunemisel**

Välja voolanud preparaati katta liiva või saepuruga kuni preparaat on täielikult läbi imunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

**Hädaabi telefon:** 112 Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

**Pakend:** 1 liiter

#### **Toote kirjeldus**

Wizard 500EC on laia toimespektriga, pika järelmõjuga kontaktne insektitsiid. Parema tulemuse saavutamiseks tuleb pritsimise ajal jälgida, et põllule ei jääks pritsimata triipe. Suuremat kulunormi kasutatakse ebasoodsate ilmastikutingimuste ja kahjurite suurema arvukuse korral.

#### **Ettevalmistus**

Enne pritsimisega valmistamist veendu, et pritsipaak ja pihustid oleks puhtad.

Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Lisa vajalik kogus Wizard 500EC-d ja lahust samaaegselt segades täida ülejäänud paak veega. Segisti jätta tööle nii transportimisel kui pritsimisel.

#### **Segatavus teiste preparaatidega**

Wizard 500EC võib segada kõikide enamlevinud herbitsiididega, fungitsiididega või insektitsiididega.

#### **Puhastamine**

Enne pritsimisega valmistamist ja pärast Wizard 500EC kasutamist tuleb pritsi hoolikalt puhastada. Selleks võib kasutada tavalist soodat 2-4 kg lisatuna 100 l pesuveele või spetsiaalset paagipesuvahendit.

#### **Säilitamine.**

Hoida kuivas ja jahedas kohas, eraldi loomasöödest, joogist ja toiduainetest. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud Põllumajandusministri 29.11.2011 määruses nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“. Kinnises originaalpakendis ja õigetes

tingimustes säilib preparaat vähemalt 2 aastat alates valmistamise kuupäevast.

#### **Jäätmete ja taara kahjutustamine**

Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga kuni preparaat on täielikult läbi imunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

#### **Kasutamine, kulunormid**

Teravili 0,05 l/ha

Ripslased, lehetäid, maakirbud, viljakärbes, öölased. Põldu pritsitakse kasvuajal kahjurite ilmunisel. Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 28 päeva, tööaeg 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 1.

Viiruskandjate lehetäide tõrjeks pritsitakse teravilja tarkamisest loomise alguseni.

Suvi- ja taliraps, sinep 0,05 l/ha

Maakirbud, peitkärsakad, hiilamardikad. Hiilamardikate tõrjeks pritsitakse enne õitsemist, maakirbu tõrjeks tõusmete faasis, varre-peitkärsaka tõrjeks kui taime vars hakkab pikenema. Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 49 päeva, tööaeg 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 14 päeva.

Kartul 0,05-0,06 l/ha

Kartulimardikas, lehetäid. Põldu pritsitakse kasvuajal kahjurite ilmunisel. Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 7 päeva, tööaeg 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall pritsimiste vahel 10 päeva.

Mais 0,05-0,15 l/ha

Viimane pritsimisaeg on BBCH 67 (täisõitsemiseni). Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall pritsimiste vahel 10 päeva. Tööaeg 5 päeva.

Hernes, uba, lupiin, roheline hernes ja roheline uba 0,05 l/ha  
Hernekärskad, lehetäid. Hernekärskade tõrjeks pritsitakse tõusmete faasis, oal ja lupiinil lehetäide tõrjeks esimeste täikolooniate ilmunisel kuni õitsemise alguseni (BBCH 59). Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 14 päeva, rohelisel hernel ja oal 7 päeva, tööaeg 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 10 päeva.

Lina 0,05 l/ha

Linakirp, ripslased, lina-tähtöölane. Põldu pritsitakse kahjurite ilmunisel. Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 49 päeva, tööaeg 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 14 päeva.

Kapsas (lillkapsas, brokoli, peakapsas, brüsseli kapsas) 0,05 l/ha.

Maakirbud, suur ja väike kapsaliblikas, peitkärsakad, kapsaöölane, kapsakoi, lehevaablane, kapsakärbes, kapsa-tuhktäi. Põldu pritsitakse kahjurite ilmunisel. Ooteaeg viimasest töötlemisest saagikoristuseni vähemalt 7 päeva, tööaeg 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 10 päeva.

Juurviljad ja juur-köögiviljad – porgand, peet (suhkru-, looma- ja punapeet), kaalikas, naeris, redis, rõigas, mustjuur, mädarõigas, petersell, seller, spinat, pastinaak, lehtpeet 0,05 l/ha.  
Lehetäid, maakirp, porgandikärbes, porgandi-lehekirp. Porgandikärbe tõrjeks pritsitakse porgandikärbe lendluse ajal, porgandi-lehekirbu tõrjeks esimeste kahjustustunnuste ilmunisel. Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 7 päeva, peetidel, kaalikal, naeril, lehtpeedil 14 päeva; tööaeg 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 10 päeva.

Mugulsibul, küüslauk, porru, šalott 0,05 l/ha.

Ripslased, sibulakoi. Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 7 päeva, tööaeg 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 10 päeva.

Spargel 0,05 l/ha. Pritsitakse pärast saagi koristust. Tööaeg 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 10 päeva.

Viinamari 0,06 l/ha

Mähkurid, lehekirbud. Pritsitakse kahjurite ilmumisel.

Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 21 päeva, tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 1.

Dekoratiivtaimed 0,05-0,1 l/ha

Lehetäid, leheröövikud, ripslased, lutikad,

kaevandikärbsed, kilptäid, mardikad, kärsakad jt.

Kärsakate ja lehetäide tõrjeks pritsitakse kulunormiga 0,05-0,1 l/ha.

Tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2.

Intervall 10 päeva.

Dekoratiivpuud 0,03-0,1 l/ha

Lehetäid, leheröövikud, ripslased, lutikad,

kaevandikärbsed, kilptäid, mardikad, kärsakad jt.

Kärsakate ja lehetäide tõrjeks pritsitakse kulunormiga 0,03-0,1 l/ha.

Tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2.

Intervall 10 päeva.

**Vee hulk:** 200 - 300 l/ha

### **Kasutaja risk**

Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse.

Kasutamish juhend ning soovitusel on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms.