

Nando 500 SC

Taimekaitsevahend

Fungitsiid

Toimeaine: fluasinaam 500 g/l

Suspensioonikontsentraat

Kontaktne fungitsiid kartuli–lehemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks

Nando 500 SC võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik



Xn KAHJULIK



N KESKKONNAOHTLIK

TÄHELEPANU!

VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE, TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÕUDEID!

Ärritab nahka.

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

Võimalik loote kahjustamise oht.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Vältida udu sissehingamist.

Vältida kokkupuudet nahaga.

Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed

Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit

Mitte saastata vett toote või selle pakendiga

Pakend: 1, 5, 10 l

Registreerimise nr: 0416/28.10.11

Partii nr.: vt. pakendilt

Valmistamise kuupäev: vt. pakendilt.

Säilivusaeg: 2 aastat valmistamiskuupäevast.

Registreeringu omanik:

Nufarm GmbH & Co KG

St.-Peter Str. 25

A-4021 Linz,

Austria

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KASUTUSJUHEND!

KASUTAMINE

Nando 500 SC – kontaktne, kaitsva toimega efektiivne fungitsiid kartuli-lehemädaniku (*Phytophthora infestans*) ja kuivlaiksuse (*Alternaria solani*) tõrjeks.

Toode toimib nakkuseelses faasis peatades spooride tekke ja idanemise; zoosporide (rändeoste) paljunemise, liikuvuse ja idanemise; katkestab energia tootmise seene mitokondrites ja takistab seene hingamist.

Omab vähesel määral ka ravivat toimet.

Pritsimise aeg ja kulunorm

Kultuur	Kulu-norm l/ha	Haigused	Pritsimise aeg	Ooteaeg
Kartul	0,3 – 0,4	Kartuli-lehemädanik, kuivlaiksus	Kasutada profülaktiliselt enne haiguse levikut	1

SOOVITATAV LAHUSE KOGUS

200 – 400 l/ha. Lahus peab katma taimed ühtlaselt, ei tohi voolata maha.

Maksimaalne kasutuste arv – 10 intervalliga 7-10 päeva.

ILMASTIKUTINGIMUSED PIHUSTAMISE AJAL

Mitte pritsida kui temperatuur ületab + 25 °C.

Mitte pritsida väga kuiva ilmaga.

Pärast pritsimist peaks mööduma 1 tund enne vihma.

SÄILITAMINE

Hoida hermeetiliselt suletud, originaalpakendis, jahedas, hästi ventileeritavas, taimekaitsevahendite hoidmiseks ette nähtud ruumides. Kaitsta otsese päikesevalguse eest.

Säilitada temperatuuril vahemikus mitte alla 0°C ja mitte üle +35°.

KAITSEVAHENDID

Töötades produktiga kasutage kaitsevahendeid: 6. tüüpi kaitseriietust, keemiakaitseülikond vastavalt standardile EN 13034; kemikaali-kindlaid kindad vastavalt standardile EN 374, nt. valmistatud nitrüülkummist; kaitseprille või näokaitset vastavalt standardile EN 166, tugevaid jalanõusid. Kui traktorikabiin ei ole hermeetiline või ei ole varustatud õhupuhasfiltritega, võivad olla vajalikud hingamisteede kaitsevahendid: poolmask filtritega A2-P2 või A2-P3 (vastavalt standardile EN 14387).

Jälgige, et lahus ei satuks nahale, silma või tööriistele. Tööriistadeid hoida eraldi. Määratud tööriistade pesti puhtaks. Töö ajal on keelatud süüa, juua ja suitsetada. Pärast töö lõppu või enne sööki pesta käed vee ja seebiga, loputage suu, vahetage riided.

TÜHJADE PAKENDITE KÄITLEMINE

Tühjad pakendid loputada 3 korda puhta veega. Loputusvesi valada pritsimislahuse hulka. Tühjad pakendid viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Mitte kasutada tühja taarat muul eesmärgil..

KAHJUTUKS TEGEMINE

Suurema koguse lekkimisel lokaliseerida leke ja imeda mahavalgunud preparaat konteinerisse.

Märg pinnasekiht segada absorbendiga ja koguda spetsiaalsesse, markeritud anumasse ning anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

ESMAABI

Kui toode on sattunud silma, pesta silmi voolava vee all vähemalt 15 minutit ja pöörduda arsti poole.

Kui toode satub nahale, pesta nahka puhta vee ja seebiga. Eemaldada saastunud või määratud riided ning jalanõud. Viivitamata pöörduda arsti poole.

Sissehingamisel viia kannatanu värske õhu kätte. Mürgistuse sümptomite tekkimisel/püsimisel pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel mitte kutsuda esile oksendamist. Viivitamata pöörduda arsti poole.

Sümptomaatiline ravi.

JURIIDILINE VASTUTUS

Preparaadi kasutamise soovitusel põhinevad teostatud katsetustel. Tootja ei vastuta tagajärgede eest, mis tekivad preparaadi vale hoiustamise ja kasutamise tagajärjel. Preparaadi kvaliteet on tagatud, kui preparaat on saadud ja hoiustatakse originaalses ja suletud pakendis, järgides preparaadi hoiustamistingimusi.