

NICORN 040SC Taimekaitsevahend. Herbitsiid Ühe- ja mitmeaastaste umbrohtude tõrjeks maisis Toimeaine: 40 g/l (4,11 %) Preparatiivne vorm: suspensioonikontsentraat Registri number: 0626/05.07.16 Professionaalseks kasutamiseks (võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik). Loa valdaja, tootja ja pakendaja: Pestila Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością., Studzianki 24a, PL-97-320 Wolbórz, Tel./Fax: +48 44 616 43 75 E-mail: info@pestila.pl Pakendid: 100 ml, 150 ml, 250 ml, 0,5 l; 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 220 l Tootmise kuupäev ja partii number: vaata pakendil Säilivusaeg: 2 aastat	Hoiatus  TAIMEKAITSEVAHENDI JA PAKENDI SÄILITAMISE JA OHUTU KÕRVALDAMISE TINGIMUSED Hoida lastele kättesaamatus kohas. Taimekaitsevahendit tuleb säilitada: - lukustatud kohtades, kus puudub juurdepääs kolmandatele isikutele ja oht keskkonna saastumiseks - originaalpakendites, vältides kontakti toiduainete, jookide või söödaga - temperatuuril 0 °C - 30°C, Keelatud on taimekaitsevahendite pakendite korduvkasutamine. Ärakasutamata taimekaitsevahend üle anda ohtlike jäätmete käitlejale. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. ESMAABI Vastumürk: puudub, sümptomaatiline ravi. Arstiabi Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata pakendit või etiketti. Arsti poole pöördumise vajadusel tuleb näidata pakendit või etiketti.	H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH 401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. Ettevaatusabinõud : P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas. P391 – Mahavoolanud toode kokku koguda. P501 – Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. SP1 – Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). SPe1 – Põhjavee kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab nikosulfurooni, rohkem kui 1 kord 2 aasta jooksul. SPe3 – Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist 20 m pinnaveekogudest. Mittesihhtmärktaimeliikide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.
---	---	--

	Kohalik hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber – 16662
--	--

TOIME UMBROHTUDELE

Nicorn 040 SC on süsteemse toimega herbitsiid. Imendub peamiselt läbi lehtede ja jaguneb kiiresti kogu taimes, pidurdades taime kasvu ja arengut. Umbrohu kasv pidurdub kohe pärast pritsimist. Seejärel muudab umbrohi värvi ning kangub täielikult 20-25 päeva pärast. Toime on kõige tugevam noore jõudsalt tärkava umbrohu tõrjel 2-4 lehe faasis. Soe ja niiske ilmastik võimendab toote mõju.

Tundlikud umbrohud: tähk-kukehirss (*Echinochloa crus-galli*), põldkannike (*Viola arvensis*), roomav madar (*Galium aparine*), konnatatar (*Polygonum consolvulus*).

Keskmiselt tundlikud umbrohud: valge hanemalts (*Chenopodium album*).

TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMINE

Mais

Kulunorm: 1,0 l/ha

Kasutamise aeg: 2-7 lehe faasis (BBCH 12-17), kui umbrohud on varases kasvufaasis (2-4 lehte).

Maksimaalne aastane kasutuskordade arv: 1

Soovitav veehulk: 200 – 300 l/ha

Soovitav pritsimisviis: keskmise suurusega tilgad

Mitte pritsida lähemal kui 20 m pinnaveekogudest ja mitte lähemal kui 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Lubatud pritsida 1 kord 2 aasta jooksul.

KÜLVIKORD

Juhul kui külmast, haigusest või kahjuritest tingitult tuleb likvideerida kogu töödeldud ala, võib põllu harimise järel külvata sellele maisi või:

- teravilja – 3 kuu möödumisel happelise pinnase puhul; 9 kuu möödumisel neutraalse ja aluselise pinnase puhul,
- kaunvilju – 9 kuu möödumisel,
- lutserni – 12 kuu möödumisel.

Järgneval kevadel võib külvata kõiki kultuure.

OHUTUSMEETMED JA HEA PÕLLUMAJANDUSTAVAGA SEOTUD KASUTAMISE SOOVITUSED

1. Kahjuritõrje strateegiad

- Nicorn 040 SC sisaldab ALS inhibiitoreid. Sama toimeainega taimekaitsevahendite kasutamine võib tingida püsivate umbrohuliikide selektsiooni. Umbrohu tekke pidurdamiseks tuleb ALS inhibiitorite gruppi kuuluvaid taimekaitsevahendeid kasutada kooskõlas hea põllumajandustavaga:
- järgige hoolikalt taimekaitsevahendi etiketil toodud juhiseid – soovituslikke koguseid ja pritsimiseks sobivaimat aega;
- kasutage optimaalseimat kündmisviisi vastavalt põllu tingimustele, pidades silmas umbrohu liike ja kasvu intensiivsust;
- kasutage umbrohutõrjeks erinevaid meetodeid, sh viljelussüsteemi jm.;
- kasutage toodet vaheldumisi teiste erineva toimega taimekaitsevahenditega;
- kasutage üheaegselt nii ALS inhibiitoritega kui muu toimeainega taimekaitsevahendeid;
- kasutage eraldi või koos teiste taimekaitsevahenditega, mis mõjutavad umbrohu erinevaid kasvufaase;
- kasutage taimekaitsevahendit vaid üks kord taime kasvuperioodil;
- teavitage turustajat, kui umbrohutõrje ei ole ootuspärane;
- küsige lisainformatsiooni kohalikult turustajalt.

2. Ebasoodsates tingimustes võib maisi pritsimise järel täheldada taimede ajutist moondumist, lehtede värvimuutust ja kasvu aeglustumist.

3. Võimaliku fütotoksilise mõju tõttu mõnele maisisordile (eriti uutele sortidele), soovitame taimekahjustuste ennetamiseks viia eelnevalt läbi katsed või kontakteeruda volitatud nõustaja või turustajaga.

4. Mitte kasutada:

- vahetult pärast pikka külmaperioodi; taimedel, mille kasv on pidurdunud madalate temperatuuride tõttu. Pritsige maisi intensiivse kasvu taastumisel;
- temperatuuril alla 10°C ja üle 25°C;
- külma, põua, kahjurite või haiguste poolt nõrgestatud taimedel;
- märgadel taimedel;
- suhkrumaisil, mis on kahjustunud või aretusmaterjal;
- maisil, mis on enam kui 7 lehe faasis.

5. Kasutamisel vältige:

- vahendi sattumist naaberpõldudele,
- vahendi korduvat pihustamist samadele aladele.

PRITSIMISSEGU VALMISTAMINE

Valmistage pritsimisegu ette vahetult enne kasutamist.

Enne pritsimissegu valmistamist tuleb täpselt määratlada selle kogus. Mõõdetud koguses vahendit valada pritsipaaki, mis on pooleldi täidetud veega (siselülitatud segistiga). Tühjendatud herbitsiidi pakendid loputada kolm korda veega ja valada loputusvesi pritsimissegu sisaldavasse pritsipaaki. Seejärel lisage pritsipaaki vett vajaliku vedelikukoguse saavutamiseks ja segage hoolikalt. Juhul, kui pritsipaagil puudub hüdrauliline segisti, tuleb pärast vahendi paaki valamist segada vedelikku mehaaniliselt. Pärast tööpausi tuleb pritsimisseg uuesti hoolikalt segada.

Segisti olgu kogu pritsimise aja jooksul sisse lülitatud.

PRITSIMISSEGU JÄÄKIDE KÄITLEMINE JA SEADMETE PESEMIN

Pritsimissegu jäägid ei tohi sattuda pinna- ja põhjavette

Selleks:

- segu jäägid pritsida pärast lahjendamist eelnevalt pritsitud alale,
- hävitada viisil, mis tagaks taimekaitsevahendis sisalduvate toimeainete bioloogilise lagunemise; või
- hävitada muul viisil vastavalt kohalikele nõuetele.

Pärast töö teostamist tuleb seadmed hoolikalt puhtaks pesta.

Seadmete puhastamiseks kasutage selleks ettenähtud puhastusvahendeid ning järgige hoolikalt puhastusvahendi kasutusjuhiseid.

VAHENDI OHUTU KASUTAMISE TINGIMUSED

Ohutusmeetmed vahendit kasutavatele isikutele:

Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

Kanda kaitsekindaid ja silmade ja näo kaitset ning kaitserõivastust, mis tagab kaitse taimekaitsevahendite mõju eest pritsimisseg valmistamise ja pritsmise ajal.

Kanda kaitsekindaid ja kaitserõivastust sisenedes pritsitavale maa-alale.

Vältida kokkupuudet naha ja silmadega.

Silma ja nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega.

Keskkonnakaitsega seotud ohutusmeetmed:

Vältida vee saastamist toote või selle pakendiga.

Mitte pesta seadmeid pinnavee läheduses.

Vältida vee saastamist majandite ja teede kuivenduskraavide kaudu.

Tööoode/ooteaeg: puudub.

Ajavahemik vahendi kasutamisest kuni päevani, millal piirkonda, kus kasutati herbitsiidi, võivad siseneda inimesed ja loomad:

Mitte siseneda enne pritsimisseg täielikku kuivamist taimede pinnal.

Ajavahemik vahendi viimasest kasutamisest kuni põllukultuuri koristamiseni (ooteaeg): puudub.

Ajavahemik vahendi viimasest kasutamisest söödaks määratud taimedele kuni päevani, millal loomi võib nende taimedega sööta (sööda ooteaeg): puudub.

Ajavahemik vahendi viimasest kasutamisest taimedele kuni päevani, millal võib külvata või istutada järelkultuure: Tuleb järgida KÜLVIKORDA