Fungazil MLF 50

Fungitsiid

Puhtimisvahend ainult suvi- ja taliodrale.

Toimeaine: imasaliil 50 g/l (4,89% w/w)
Preparaadi vorm: mikroemulsioon

Eesti reg nr: 0254/31.10.08

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.



Hoiatus

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendi nõudeid.

P273 Vältida sattumist keskkonda.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Kasutamiseks ainult suvi- ja taliodra puhtimisvahendina. Kasutada ainult sildil näidatud kahjurite tõrjeks. Nimetatud koguseid mitte ületada. Töödeldud seemned tuleb koheselt pakkida kottidesse ja õhukindlalt sulgeda.

Puhitud seemned on ohtlikud ning neid ei tohi kasutada söögiks ega loomasöödaks. Pakendit ei tohi kasutada toiduteravilja ja muude toiduainete ning söötade jaoks.

Antud avaldus peab olema sildilt selgesti loetav või siis pakendile kinnitatud selliselt, et silt jääks loetavaks seni kuni pakendi kogu sisu on kasutatud.

Kultuur	Haigustekitaja	Maksimaalne kulunorm	Pritsimise ajastamine	Märkused
Suvioder	*Pyrenophora graminae*: Odra-triiptõbi *Fusarium spp.*: Kõrreliste juuremädanik *Pyrenophora teres:* võrklaiksus *Alternaria:* Nõgihallitus *Penicillium:* Hallitus	1.0 l/t terade kohta	BBCH 00 – seeme	Maksimaalselt 1 pritsimine aastas.
Talioder	*Pyrenophora graminae*: Odra-triiptõbi *Fusarium spp.*: Kõrreliste juuremädanik *Aspergillus:* Hallitus *Ustilago nuda:* Odra lendnõgi *Alternaria*: Nõgihallitus Cladosporium: Nõgihallitus	1.0-1.3 l/t terade kohta	BBCH 00 – seeme	Maksimaalselt 1 pritsimine aastas.

Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit. Kasutamine, mis ei ole kooskõlas juhendiga võib olla seadusega vastuolus.

OHUTUSNÕUDED
TOOTE KÄITLEMINE
Seemnete töötlemisel ja töödeldud seemnete käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid. Kokkupuutel naha ja silmadega pesta koheselt rohke veega. Ohu vähendamiseks on soovitav kasutada kaitseriietust (põlle), respiraatorit, saapaid ja kaitseprille, seda eriti toote käitlemisel seemnete töötlemise ajal ja pärast seda.

ESMAABI
Kokkupuutel nahaga pesta koheselt rohke vee ja seebiga.
Silma sattumisel loputada silmi jooksva veega vähemalt 15 minuti jooksul. Konsulteerida arstiga.
Allaneelamise korral loputada suud veega. Konsulteerida arstiga.
Sissehingamine ei ole tõenäoline.

Loa valdaja:
UPL Holdings Coöperatief U.A., Claudius Prinsenlaan 144 A, Blok A, 4818CP Breda, The Netherlands
Tel: +31 (0) 85 0712300 Email: uplholdingscoop@upl-ltd.com

Pakendid: **25 l, 200 l, 700 l või 1000 liitrit**

Hoida külmumise eest

Partii number: Vaata pakendit
Tootmise kuupäev: Vaata pakendit

Tootja ja pakendaja:
UPL Europe Ltd., Engine Rooms, 1st floor, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN, United Kingdom

KASUTUSJUHEND
Kasutamiseks ainult suvi- ja taliodra seemnepuhtimisseguna.
Fungazil MLF 50 on vedel fungitsiid kasutamiseks suvi- ja taliodra seemnepuhtimisseguna. Fungazil MLF 50 on süsteemse toimega fungitsiid erinevate seenhaiguste tõrjeks kaasa arvatud *Fusarium* ja *Pyrenophora graminea* tõrjeks. Toode on kasutamiseks valmis.

Kasutamine: Võrdse ja ühtlase pritsimistulemuse saavutamiseks loksutage toodet enne pritsimist tugevalt, et tekiks homogeenne lahus.

Suvioder	1.0 l/t terade kohta
Talioder	1.0-1.3 l/t terade kohta

Segamine: Kasutage seemnete töötlemiseks lahjendamata Fungazil MLF 50.

Tuleoht: Fungazil MLF 50 ei ole tuleohtlik, kuid kuumenemisel võivad eralduda mürgised gaasid.

Hoiustamine: Hoida külmumise eest

Jäätmete kõrvaldamine: Kõrvaldada nagu tavalised tööstusjäätmed. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad ja loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

Resistentsus
Paljude fungitsiididega on oht kasutatava toimeaine suhtes resistentsete biotüüpide tekkimiseks. Fungazil MLF 50 toimeaine kuulub sterooli biosünteesi inhibiitorite klass 1 hulka (imidasool, FRAC grupp G!, FRAC grupi kood 3), mille riski resistentsuse tekkimisel hinnatakse keskmiseks.

Resistentsuse tekkimise riski suurendab korduv samatüübiliste toodete kasutamine. Riskide vähendamiseks tohib toodet kasutada üks kord aastas/kasvuperioodil. Resistentsuse tekke riskide vähendamiseks on soovitav erineva toimeainega ja asjaomaste liikide suhtes hea efektiivsusega tooteid segada või vahetada.

HÄDAABI TELEFON 112; Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662