

EMDEE

Taimekaitsevahend Herbitsiid

Kasutusala: lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks teraviljadel, hernel, hernesegatisel, kõrrelistel heintaimedel, punase ristiku puhas- ja allakülvidel, idakitsehernel, linal ja tatral.

Toimeaine: MCPA 750 g/l

Preparaadi vorm: vesilahus

Eesti registreerimisnumber: 825/20.05.22

EMDEE-t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik!

Toode sisaldab ohtlikke aineid MCPA-DMA ja 4-kloro-2-metüülfenool. Valmistamise partii ja kuupäev: vaata pakendilt.



ETTEVAATUST!

VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE, TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÕUDEID!

H302 - Allaneelamisel kahjulik.

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

EUH401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P264 - Pärast käitlemist pesta hooliga käsi ja nägu.

P270 - Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

P280 - Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SP1 - Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Säilitamistingimused: säilitada kinnises/lukustatavas kohas, originaalpakendis, varustatuna etiketiga, kuivas, jahedas ja ventileeritud kohas. Garanteeritud säilivusaeg, kinnises originaalpakendis säilitatuna ettenähtud tingimustes on minimaalselt kaks aastat valmistamisest.

Taara kahjutustamine: vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tühja taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast

tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Kemikaali jäägid tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks, koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

Taara purunemisel: Mahaläinud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on täielikult läbi imunud. Juhul kui lahust pole võimalik teistmoodi ohustada, eemalda ka kuni 5 cm pinnast. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, taara- ja pritsi pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Rangelt on keelatud preparaadi kasutamine lahtiste veekogude ja kaevude vahetus läheduses, vältimaks pinna- ja põhjavee saastumist. Mitte pritsida, kui tuule kiirus on üle 4 m/s.

Tulekahju korral: Teavitada tuletõrjet. Kustutada võimalikult varajases põlemisstaadiumis, juhul kui see on ohutu. Informeeri tuletõrjet, et tulekahjuga on seotud taimekaitsevahendid. Kanda tule kustutamisel ja koristustöödel hingamisteede kaitsevahendeid. Sobivad tulekustutamise vahendid on piserdatav veejuga, vaht, kustutuspulber ja CO₂.

MÜRGISTUSTEABEKESKUSE LÜHINUMBER 16662.

HÄDAABI TELEFON 112.

Pakend: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 1000 l

Loahaldaja:

Sharda Cropchem España S.L.,
Edificio Atalaya Business Center,
Carril Condomina nº6, Planta 12, 30006, 30006 Murcia, Hispaania, tel.: +34 868 12 75 89

Tootja/pakendaja:

Sharda Cropchem Ltd.
2nd floor, Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West)
Mumbai – 400 056 India

Ettevaatusabinõud: preparaadiga töötades täita tööohutus eeskirju. Kasutada vastavat kaitseriietust, kindaid, silmade/näo ja hingamisteede kaitsevahendeid. Pesta käed ja nägu kohe pärast töö lõpetamist seebi ja veega. Vältida preparaadi nahale ja silma sattumist ning pritsimisdu sissehingamist. Töötamise ajal on keelatud süüa, juua ja suitsetada.

Esmaabi: kannatanu viia ohutsoonist eemale. Teadvusekaotuse puhul asetada/ transportida stabiilses, külili asendis. Mürgituse kahtluse korral kutsuge arst. Võimaluse korral näidake arstile kemikaali pakendit või etiketti. **Ravi abinõud:** esmaabi, saastest puhastamine, sümptomaatiline ravi. Otsest vastumürki pole teada. **Sissehingamisel:** viia kannatanu värske õhu kätte, vajadusel anda talle hapnikku või teha kunstlikku hingamist. Suurema ohu korral pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga:

eemaldada koheselt preparaadiga kokkupuutunud või läbiimunud riided ja pesta nahka viivitamatult ohtra vee ja seebiga. Ärrituse korral pöörduda arsti poole. **Sattumisel silma:** pesta silmi viivitamatult põhjalikult rohke veega 15 minutit (silmalaud avatud). Kui silmade ärritus püsib, võtta ühendust silmaarstiga. **Sattumisel seedeorganitesse:** kui preparaati on alla neelatud, viia kannatanu värske õhu kätte ja helistada koheselt kiirabisse. Mitte esile kutsuda oksendamist ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata. Ärge püüdke teadvusetule inimesele suu kaudu midagi manustada. Mürgituse sümptomid ebaspetsiifilised.

Töölause valmistamine: **Pritsi puhastamine:** 1. Tühjenda prits täielikult põllul. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti äsja pritsitud kultuurile. 2. Täida pritsi paak pesemiskohas puhta veega ja lisa 100 l vee kohta 1 liiter 3 %-list ammoniaagi vesilahust. Pritsi mõne minuti jooksul pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega lahust paagis 15 minutit. Tühjenda prits. 3. Loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega. 4. Võta ära pihustid ja filtrid ning pese need eraldi pesuainetega. Loputa paaki veega 5 minuti jooksul ja lase vesi välja läbi poomide ja pihustite. Jälgi, et pesu- ja loputusvesi ei kahjustaks puid või tundlikke taimi ega saastaks pinna- või põhjavett.

Kasutamisyjuhend:

Suviteravili: 1,3-2,0 l/ha teravilja võrsumisfaasis. **Taliteravili:** 2,0-2,4 l/ha kevadel esimese kõrresõlme moodustumiseni. Põldohakat pritsida kulunormiga 2,4 l/ha kui see on 15-25 cm pikk ning piimohakat rosetifaasis. **Suviteravili, taliteravili:** 1,0 l/ha, kui põllul esineb palju ohakat. Pritsida teravilja hilisemas kasvufaasis (kuni kõrsumise lõpuni, kui lipulehe keeleke on ilmunud nähtavale), mitte rohkem kui 1 kord. **Punase ristiku puhas- ja allakülvid:** 1,0 l/ha ristiku 1-2 kolmetislehe faasis ja kattevilja võrsumise ajal. **Idakitsehernes:** 1,0 l/ha 1-2 pärislehe faasis. **Kõrrelised heintaimed külviaastal:** 1,3-2,0 l/ha pärast kõrshainte täielikku tärkamist, kõige hiljem 3 nädalat enne niitmist või loomade karjatamist. **Punase ristiku seemnepõld saagiaastal:** 1,0-1,4 l/ha kevadel 2-3 nädalat pärast kasvu algust. **Hernes ja hernesegatis:** 0,9 l/ha kui hernes on 3-8 cm kõrgune (herne 3-6 lehe faasis). Võib põhjustada ajutise kasvupidurduse ja võrsete kõverdumise. **Tatar:** 1,5 l/ha enne tärkamist. **Lina:** 0,9-1,3 l/ha kui umbrohul on 2-4 pärislehte, lina on "kuusekese" faasis (taimed 3-10 cm kõrgused).

Vee kulu: 200-400 l/ha. **Ooteaeg:** hernel, ida-kitsehernel ja ristikul on 45 päeva.

Tähelepanu kasutamisel: hoiduda pritsimislahuse kandumisest tuulega kõrvalasuvatele kultuuridele.

Vältida preparaadi pritsimist kõrgetel temperatuuridel (üle +25°C) ja intensiivses päikesevalguses.

Preparaati ei soovitata pritsida kultuurile, mis on tugevas stressis.

NB! Pritsitud taimi võib loomadele sööta 45 päeva möödudes.

Paagisegud: segatav enamike herbitsiididega, fungitsiididega ja insektitsiididega.

Tähelepanu! Preparaat valmistatakse hoolika kontrolli all ja tootjafirma tagab õieti säilitatud ja originaalpakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisyjuhend ning soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud toote vale kasutamine, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.

® registreeritud kaubamärk kuulub Sharda Cropchem Limited