LIMA ORO

Taimekaitsevahend
Molluskitsiid

Taimekaitsevahend tigude ja nälkjate hävitamiseks teraviljadel, salatil, suvi- ja talirapsil, kartulil, marjapõõsastel, maisil, ilutaimedel, karjamaadel, murul ning seemneviljaliste viljapuude aedades.

Toimeaine: metaldehüüd 50 g/kg
Preparatiivne vorm: granuleeritud sööt
Eesti reg. nr.: 0588/21.01.16
Pakend: 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg.
Loa haldaja: Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, Planta 12, 30006 Murcia, Hispaania
Tootja/pakkija: Sharda Cropchem Limited, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai- 400 050, India
Esindaja/Edasimüüja: SCANDAGRA ESSTI AS, Tehe 13,Viljandi, EE71020, Estonia
Valmistamise kuupäev ja partii No: vt pakendilt

Toode sisaldab ohtlikke aineid metaldehüüd ja kaltsiumhüdroksiid!
Toodet LIMA ORO tohib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!

Mürgistuse korral võtke ühendust Mürgistusteabekeskusega telefonil 16662.
Hädaabitelefon: 112



HOIATUS

H361f	Arvatavasti kahjustab viljakust.
P101	Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pekend või etikett.
P102	Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P280	Kanda kaitsekindaid.
P308+P313	Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P235+P410	Hoida jahedas. Hoida päikesevalguse eest.
EUH401	Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
SP1	Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe6	Lindude/metsloomade kaitsmiseks kõrvaldada mahavalgunud vahend.
SPr1	Peibutussööt tuleb ohutult ladustada selliselt, et minimeerida teiste loomade poolt tarbimise ohtu.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

ESMAABI
Enesetunde halvenemisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või selle etiketti. Õnnetuse korral helistada HÄDAABI TELEFONILE 112.
Allaneelamisel: Loputada suud veega. Viivitamatult helistada Mürgistusteabekeskusesse või arstile. **Sissehingamisel:** Viia kannatanu värske õhu kätte, hingamise katkemisel teha kunstlikku hingamist. Kutsuda arst. **Kokkupuutel nahaga:** Eemaldada saastunud rõivad.
Pesta saastunud ala rohke veega. **Kokkupuutel silmadega:** Eemaldada koheselt kontaktläätsed (kui neid kantakse) ning loputada rohke veega 20 minutit. Kontakteeruda koheselt arstiga (võimalusel näidata etiketti).

OHUTUSMEETMED JA HEA PÕLLUMAJANDUSTAVAGA SEOTUD KASUTAMISE SOOVITUSED
Vältida preparaadi jääkide sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Veeorganismide kaitseks soovitab tootja preparaati kasutada mitte lähemal kui 5m pinnaveekogudest.
Lindude ja loomade kaitseks eemaldada juhuslikult mullale sattunud toode.
Hoida koduloomad ja –linnud töödeldud alast eemal!
Preparaadi graanulid peavad kukkuma veest vähemalt 5m kaugusele. Selleks tuleb arvestada külviku parameetritega ja külvik õigesti kalibreerida.

- Kalibreerige külvik enne kasutamist
- Täitke ja puhastage külvik põllul
- Ärge täitke ja puhastage aias

KASUTUSJUHEND
LIMA ORO on preparaat tigude ja nälkjate hävitamiseks teraviljadel, salatil, suvi- ja talirapsil, kartulil, marjapõõsastel, maisil, ilutaimedel, karjamaadel, murul ning seemneviljaliste viljapuude aedades.
Parimaid tulemusi saavutatakse, kui toodet kasutatakse vaikse ja niiske ilmaga, mil tigude ja nälkjate elutegevus on kõige aktiivsem. Kui tigude ja nälkjate poolne kahjustamine jätkub, tuleb preparaadi kasutamist korrata.
MITTE KASUTADA enne tugevat vihma, sest see võib põhjustada liiga kiire graanulite lagunemise. Kasutamine lehtköögiviljadel liiga hilises arengufaasis võib põhjustada graanulite takerdumist lehestikku, mistõttu seda tuleb toidukultuuride puhul võimalusel vältida või sooritada erilise ettevaatusega.

Kasutamine
Kulunorm: 7 kg/ha
Toode laotada ühtlaselt kas mullale või kasvavale kultuurile, kasutades kas graanulkülvikut või käsitsilaotamist.
Külvatavate kultuuride puhul saavutatakse parimaid tulemusi tigude tõrjel graanulite kasutamisega mõned päevad enne külvi. Alternatiivina võib graanuleid kasutada vahetult pärast külvamist. Tärganud või juba kasvavate kultuuride puhul tuleb graanuleid kasutada koheselt kahjustuste ilmnemisel.
Teraviljade ja rapsi puhul võib preparaadi panna mullale.
Maksimaalne kasutuskordade arv: 2 korda hooajal (maksimum 14kg/ha), minimaalne intervall 7-10 päeva.

TAIM	**PREPARAADI KASUTAMINE**
Teraviljad	Kasutada külvist kuni võrsumise lõpuni (BBCH 29)
Salat	Kasutada külvist kuni faasini, mil 10% sordile omasest lehemassist on saavutatud (BBCH 41)

Tali- ja suviraps	Kasutada külvist kuni kõrvalvõrsete arengu lõpuni (BBCH 29)
Kartul	Kasutada mugulate mahapanekust kuni pealsete hävimiseni (BBCH97)
Marjapõõsad	Kasutada kuni õitsemise lõpuni (BBCH 69)
Mais	Kasutada külvist kuni 5. lehe lahtikeerdumiseni (BBCH 15)
Ilutaimed	Kasutada külvist kuni seemnete valmimiseni (BBCH 99)
Karjamaad ja murud	Karjamaad: kasutada külvist kuni BBCH 15 Murud: kasutada külvist kuni kasvuhooaja lõpuni
Viljapuud: õun ja pirn	Kasutada kuni õielehtede lõpliku varisemiseni (BBCH 69)

Jäätmete ja pakendi kahjutustamine Toote jäägid ja lekkinud toode kujutavad endast ohtlikke jäätmeid ja need tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad ja kolm korda loputatud pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. Pakendite korduvkasutamine on keelatud.

Säilitamine Hoida kuivas, jahedas, hästi ventileeritud ja valguse eest kaitstud kohas, hermeetiliselt suletud originaalpakendis. Vältides temperatuure alla 0ºC ja üle 30ºC. Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast.